



## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

### ESCUELA ACADÈMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

#### TESIS

Barreras relacionadas con la aplicabilidad de prácticas preventivas del cáncer de cérvix en mujeres de la comunidad las Ánimas – Monsefù 2014

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN  
ENFERMERÌA

#### Autoras:

Bach. Hernández Bazán Alicia  
Bach. Rivas Aponte Marisol Isabel

PIMENTEL – FEBRERO 2015

## **RESUMEN**

La investigación tuvo como título Barreras relacionadas con la aplicabilidad de prácticas preventivas del cáncer de cérvix en mujeres de la comunidad las Ánimas - Monsefù 2014. El objetivo consistió en determinar cuáles son las barreras relacionadas con la aplicabilidad de prácticas preventivas del cáncer de cérvix en mujeres de la comunidad las Ánimas. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa- descriptivo con diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo constituida por 200 mujeres y la muestra se definió por muestreo aleatorio simple donde se obtuvo 60 mujeres comprendidas entre las edades de 16 y 60 años, se tuvo en cuenta los criterios de inclusión: mujeres que han iniciado vida sexual, mujeres que no se han realizado el Papanicolaou, mujeres menores de edad que han iniciado vida sexual cuyos padres han autorizado para que participen del estudio, mujeres que deciden participar voluntariamente. Y los criterios de exclusión: mujeres que no desean participar en la investigación, mujeres menores de edad que han iniciado vida sexual pero sus padres no autorizan la participación en el estudio, mujeres que no han iniciado vida sexual, mujeres con antecedentes de cáncer cérvix, tratadas o no. Se utilizó la técnica de encuesta y observación, previa autorización de las mujeres en estudio. La confiabilidad mediante el alfa de cronbach fue de 0.789. Los resultados fueron que las barreras culturales y barreras psicológicas son las barreras que más destacan (45% y 28% respectivamente), seguido de barreras administrativas con 15.5%, barreras demográficas 11.5%. Los criterios de rigor científico utilizados son: credibilidad, auditabilidad, transferibilidad y de rigor ético son: respeto a las personas, beneficencia, consentimiento informado. La conclusión de la investigación es que las barreras culturales representadas por un 45% son las más frecuentes que limitan el cuidado y no promueven prácticas preventivas dentro de ellas tenemos: falta de tiempo, desconocimiento del examen y trabajo a pesar de que lo consideran importante, se recomendó brindar sesiones educativas periódicamente en los centros de salud y puestos de salud sobre la prevención de cáncer de cérvix

## **ABSTRACT**

The research was entitled relating to the applicability of preventive practices of cervical cancer in women in the community Souls Barriers - Monsefù 2014. The aim was to identify barriers related to the applicability of preventive practices of cervical cancer in women are of Souls community. The methodology used was descriptive quantitatively guy with no experimental cross-sectional design. The population consisted of 200 women and the sample was defined by simple random sampling where 60 women included was obtained between the ages of 16 and 60, the inclusion criteria were taken into account: women who initiated sexual life, women who do not have been performed Pap, underage women who have initiated sexual life whose parents are authorized to participate in the study, women who choose to participate voluntarily. And the exclusion criteria: women who do not wish to participate in research, underage women who initiated sexual life but his parents did not authorize participation in the study, women who have not initiated sexual life, women with a history of cervical cancer, treated or not. Technical survey and observation was used, prior authorization of the women in the study. The reliability by Cronbach's alpha was 0.789. The results were that cultural barriers and psychological barriers are the barriers that stand (45% and 28% respectively), followed by administrative barriers to 15.5%, 11.5% demographic barriers. The scientific criteria used are: credibility, auditability, transferability and ethical rigor are: respect for persons, beneficence, informed consent. The conclusion of the research is that cultural barriers represented by 45% are most common limiting and do not promote preventive care practices within them are: lack of time, lack of consideration and work even though they consider important, recommended periodically provide educational sessions in health centers and health posts on the prevention of cervical cancer