



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**TESIS**

**FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN  
LA RENUENCIA AL EXAMEN DE PAPANICOLAOU  
EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II  
LA VICTORIA-2019**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**Autora:**

**Bach. Torres Díaz Obdulia Consuelo**

**<https://orcid.org/0000-0001-8581-0640>**

**Asesora:**

**Mg. Heredia Llatas Flor Delicia**

**<https://orcid.org/0000-0001-6260-9960>**

**Línea de Investigación:**

**Ciencias de la vida y cuidado de la salud humana  
Pimentel – Perú 2020**

**FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA  
RENUENCIA AL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL  
CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019**

PRESENTADO POR:

**BACH. OBDULIA CONSUELO TORRES DIAZ**

A la Escuela de Enfermería de la Universidad Señor de Sipán

Para optar el título de:

**LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

APROBADO POR:

---

Mg. Ninoshka Bulissa Mittrany Dávila

PRESIDENTA

---

Mg. Aura Cecilia País Lescano

SECRETARIA

---

Mg. Janet Avalos Hubeck

VOCAL

## **DEDICATORIA**

A Dios por haberme dado sabiduría y fuerzas guiándome en el trayecto de mi vida, por darme salud y bendición para alcanzar mis metas como persona y como profesional.

A mi esposo e hijas por su apoyo, amor y paciencia, haciendo posible cumplir este sueño hecho realidad, y a toda mi familia por estar siempre presente.

*Obdulia Consuelo*

## AGREDECIMIENTO

A mi asesora y profesora Mg. Flor Delicia Heredia Llatas, principal colaboradora durante todo el proceso, quien con su asesoría, dirección, conocimientos y enseñanzas permitió el desarrollo de este trabajo.

Al jurado integrado por la Mg. Ninoshka Bulissa Mittrany Dávila, Mg. Aura Cecilia País Lescano y Mg. Janet Avalos Hubeck, por sus correcciones oportunas y completa disposición en la evaluación del trabajo

A mis amigos quienes, sin estar directamente involucrados, me dieron su apoyo para seguir adelante.

*Obdulia Consuelo*

## RESUMEN

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019. Estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental transversal, diseño correlacional, la muestra estuvo conformada por 99 usuarias del Centro de Salud la Victoria Sector II, la recolección de datos fué mediante la encuesta. Resultados: se encontró en factores sociodemograficos; que el 23.2 % de las usuarias tienen edades de 31 a 38 años y de 47 a 54 años, el 46.5% es conviviente, el 53.5% tienen nivel de instrucción secundaria y el 70.7% tienen como ocupación ser ama de casa, el 77.8% de las usuarias profesan la religión católica. En factores socioculturales; el 52.5% tiene creencias con respecto al examen de Papanicolaou; el 83.8% cree que el examen de Papanicolaou no ocasiona molestias; un 80.8% sabe que no causa dolor ni ocasiona sangrado, un 83.8% indica no sentir ofensa y vergüenza; y el 91.9% sabe que no se contraen infecciones durante el examen de Papanicolaou. En nivel de conocimiento del examen del papanicolaou; un 59% indican que el examen de Papanicolaou es un método diagnóstico para detectar células cancerígenas en el cérvix uterino; el 55.6% sabe dónde deberían realizarse este examen, el 71.7% indica que este examen debe realizarse una vez al año. Conclusión: existe relación significativa entre ambas variables; Factores socioculturales y renuencia al examen de Papanicolaou.

**Palabras clave:** Factores socioculturales, factores sociodemográficos, renuencia, examen de Papanicolaou.

## **ABSTRACT**

This research work aimed to determine the sociocultural factors influencing the reluctance of the Pap test in users of the Sector II Health Center La Victoria-2019. Quantitative, descriptive, non-experimental cross-sectional study, correlational design, the sample was made up of 99 users of the Victoria Sector II Health Center, the data collection was through the survey. Results: found in sociodemographic factors; that 23.2% of the users are ages 31 to 38 years and 47 to 54 years old, 46.5% are living together, 53.5% have secondary education level and 70.7% are employed as a housewife, 77.8% of the users profess the Catholic religion. In sociocultural factors; 52.5% have beliefs regarding the Pap test; 83.8% believe that the Pap test does not cause discomfort; 80.8% know that it does not cause pain or cause bleeding, 83.8% say they feel no offense and shame; and 91.9% know that they do not get infections during the Pap test. At the level of knowledge of the Pap test; 59% indicate that the Pap test is a diagnostic method to detect cancer cells in the uterine cervix; 55.6% know where this test should be done, 71.7% indicate that this test should be done once a year. Conclusion: there is a significant relationship between both variables; Sociocultural factors and reluctance of the Pap test.

**Key words:** Sociocultural factors, sociodemographic factors, Reluctance, Pap smear.

## ÍNDICE

<b>DEDICATORIA</b> .....	iii
<b>AGRADECIMIENTO</b> .....	iv
<b>RESUMEN</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	10
1.1. Realidad Problemática.....	11
1.2. Trabajos previos.....	12
1.3. Teorías relacionadas al tema.....	15
1.4. Formulación del problema.....	18
1.5. Justificación .....	19
1.6. Hipótesis.....	19
1.7. Objetivos.....	19
1.7.1 Objetivo general.....	19
1.7.2 Objetivos específicos.....	20
<b>II. MATERIAL Y MÉTODOS</b> .....	20
2.1. Tipo y diseño de investigación.....	20
2.1. Tipo de investigación.....	20
2.2. Diseño de investigación.....	20
2.3. Población y muestra.....	21
2.4. Población.....	21
2.5. Muestra.....	22
2.6. Variables, operacionalización.....	22
2.7. Método.....	24
2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	24
2.9. Procedimientos de análisis de datos.....	26
2.10. Criterios éticos.....	26
2.11. Criterios de rigor científico.....	26
<b>III. RESULTADOS</b> .....	27
3.1. Resultados de tablas y figuras.....	27
3.2. Discusión de resultados.....	39
<b>IV. CONCLUSIONES</b> .....	43
<b>V. RECOMENDACIONES</b> .....	44
<b>VI. REFERENCIAS</b> .....	45
<b>VII. ANEXOS</b> .....	51
Matriz de consistencia de informe de investigación científica.....	51
Instrumento de recolección de datos.....	52
Validación de expertos.....	56
Autorización de recolección de datos.....	62
Formato N°T1-VRI-USS autorización de publicación del autor.....	63
Acta de originalidad de informe de investigación.....	64
Reporte Turniti.....	65

## Índice de tablas

Tabla 1	Operacionalización de variable Factores socioculturales	23
Tabla 2	Operacionalización de variable Renuencia al examen de Papanicolaou	24
Tabla 3	Edades de las usuarias encuestadas	27
Tabla 4	Nivel de instrucción de las usuarias encuestadas	28
Tabla 5	Religión que profesan las usuarias encuestadas	29
Tabla 6	Creencias si se tiene pareja sexual deben hacer el examen de Papanicolaou	30
Tabla 7	Creencia con respecto a mostrar sus partes íntimas es ofensa y vergüenza en el examen de Papanicolaou.	31
Tabla 8	Creencias que le pueden afectar en el cuello uterino en el examen de Papanicolaou	32
Tabla 9	Creencias que sólo las mujeres que tienen hijos deben hacerse el examen de Papanicolaou	33
Tabla 10	Creencias que el examen de Papanicolaou es costoso	34
Tabla 11	Número de parejas sexuales	35
Tabla 12	Edad de inicio de las relaciones sexuales	36
Tabla 13	Conocimiento del examen de Papanicolaou	37
Tabla 14	Conocimiento sobre periodo de tiempo para realizarse el examen de Papanicolaou.	38



## Índice de figuras

Figura 1	Estado civil de las usuarias encuestadas	27
Figura 2	Actividad ocupacional de las usuarias encuestadas	28
Figura 3	Creencias con respecto al examen de Papanicolaou	29
Figura 4	Creencias con respecto a sentir dolor y sangrado en el examen de Papanicolaou	30
Figura 5	Creencias con respecto a contraer infecciones en el examen de Papanicolaou	31
Figura 6	Creencia sobre si se tienen pareja sexual deben hacer la toma de muestra del Papanicolaou	32
Figura 7	Creencias que la pareja este de acuerdo para el examen de Papanicolaou	33
Figura 8	Creencias si tienen una sola pareja sexual (esposo o conviviente) no debes realizarte el examen de Papanicolaou	34
Figura 9	Número de hijos que tienen las usuarias encuestadas	35
Figura 10	Periodo de tiempo que no asiste a un examen de Papanicolaou	36
Figura 11	Conocimiento sobre lugar a realizarse el examen de Papanicolaou	37
Figura 12	Conocimientos sobre los beneficios del examen de Papanicolaou en la salud	38

## **I. INTRODUCCIÓN**

El examen de citología vaginal o también conocida muestra de Papanicolaou, se realiza con la finalidad de examinar las células anómalas que puedan ocasionar neoplasia cervicouterina.<sup>1</sup> Si las células que revisten el cuello uterino comienzan a desarrollarse de manera descontrolada puede producir cáncer<sup>2</sup>.

Las principales causas que aumenta la posibilidad de padecer cáncer de cuello uterino es la infección por el virus de papiloma humano, deficiencia del sistema inmunitario, otras infecciones de índole sexual como el herpes y clamidiasis, excesivo uso de anticonceptivos orales, obesidad, mujeres entre 15 a 30 años de edad, tabaquismo y antecedentes familiares. Para evitar el cáncer de cuello, los especialistas recomiendan fomentar una cultura de salud preventiva<sup>3</sup>.

La Organización Panamericana de la Salud (2018), reportó 70.000 mujeres con cáncer de cuello uterino en Latinoamérica y falleciendo 34.000 de ellas. La tasa de morbilidad es 3 veces más alta en Latinoamérica comparado con la de Estados Unidos de Norte América; esto se debe, a la efectividad de los programas de prevención o detención temprana de este mal<sup>4</sup>.

En el Perú, estadísticas publicadas por la Liga Contra el Cáncer (2016), se diagnosticó con cáncer de cuello uterino 14 mujeres por día aproximadamente y 7 mujeres murieron por la falta de programas de prevención oportuna. Motivo por el cual es necesario desarrollar programas de sensibilización de esta mal que va en aumento e informar de la importancia de la detención temprana con exámenes de Papanicolaou<sup>5</sup>.

## 1.1. Realidad Problemática.

La Organización Panamericana de la Salud (2017), refiere que el cáncer cervical es el segundo cáncer habitual en Latinoamérica y el Caribe.<sup>6</sup>

Según, la investigación realizada por Velasco, F. (2016), en la Universidad de Tabasco de México, refiere que los principales factores que influyen en las mujeres indígenas para realizarse la prueba de Papanicolaou están relacionados al pudor y la indiferencia, así como la opinión de la pareja para realizarse dicha prueba.<sup>7</sup>

En Guatemala, Camey, C. (2015) en la Universidad Rafael Landívar, realizó un estudio con el propósito de investigar la renuencia al examen de Papanicolau en mujeres mayores de 18 años de edad; el cual concluye, que ellas son renuentes a dicho examen, por razones principalmente culturales, así como al temor y sentimientos de pudor, molestia y dolor.<sup>8</sup>

En Nicaragua, Centeno, D. y Torres, M. (2015), realizan una investigación con el objetivo de identificar los factores que intervienen en el rechazo a realizarse la prueba de Papanicolau. Concluyen, que el rechazo a dicha prueba, se debe a la vergüenza, falta de conocimiento y miedo al procedimiento.<sup>9</sup>

El Ministerio de Salud (2017) del Perú, publica la Guía de Orientación para la práctica clínica a través de estrategias innovadoras para la prevención y/o manejo adecuado del cáncer de cuello uterino, con la finalidad de reducir las altas tasas de morbilidad y mortalidad en nuestro país.<sup>10</sup>

En la Universidad Católica, Arévalo, M. (2017), realiza una investigación cuya muestra es de 130 mujeres; su objetivo fue, identificar los factores demográficos, sociales y culturales y el conocimiento del examen del Papanicolaou. Concluye, que la mayoría de las investigadas, referían tener mitos, como “es muy doloroso la prueba”, “soy joven, no es necesario el examen”, “los resultados son falsos”, etc. Y según el grado de instrucción de ellas, disminuía estos mitos sobre el examen de Papanicolaou.<sup>11</sup>

En el Callao, en una investigación realizada por Oliva, H. (2015), con el objetivo de medir las actitudes del sexo femenino activas sexualmente con respecto al examen de Papanicolaou. Concluyó, que la mayoría de ellas, manifiestan opiniones favorables al examen, tienen conocimiento de su finalidad y se debe realizar cuando hay molestias en la vagina.<sup>12</sup>

En Amazonas, en la investigación realizada por Cruz, E. (2015) en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas, en una muestra de 53 mujeres, mayores de 20 años de edad. Tiene como objetivo, identificar los factores limitantes a la realización del examen del Papanicolau. Culminada su investigación, pudo detectar algunas variables psicológicas; siendo limitantes, como la vergüenza, culpa, pudor de exponer sus partes íntimas, nerviosismo, percepciones de que la prueba es dolorosa, entre otros, seguido del factor cognoscitivo, culturales y sociales.<sup>13</sup>

En el Centro de Salud Sector II la Victoria (2019) de Chiclayo -donde actualmente laboro-, se ha podido observar que las usuarias que acuden para ser atendidas en este Establecimiento de Salud, son renuentes asistir al servicio de obstetricia para realizarse el examen de Papanicolaou. Muchas de ellas manifiestan no realizarse el examen por miedo, dolor, vergüenza, tiempo y creencias. Es por eso que surge el interés de investigar sobre cuáles son los factores socioculturales influyentes en la renuencia a este examen.

## **1.2. Trabajos previos**

A nivel Internacional Andrade y Landívar (2017), Ecuador, realizan una investigación sobre el conocimiento, las actitudes y las prácticas referente al examen de Papanicolaou, en una muestra de 84 pacientes atendidas en el servicio de obstetricia del Hospital Maldonado Carbo. Los resultados refieren que las mujeres no se realizan el examen del Papanicolaou por temor y la vergüenza. Asimismo, se observó que más del 40% de la muestra investigada mostraban escaso nivel de conocimiento sobre la prueba cérvico vaginal y el 97% poseen actitudes favorables hacia el examen.<sup>14</sup>

Saldaña, T. y Montero, L. (2017), México, llevan a cabo un estudio sobre las barreras que afronta la población indígena mexicana para la toma de la citología cervical. El objetivo del estudio es identificar las barreras estructurales, psicosociales y culturales percibidas por el personal de salud para la toma de la citología cervical en mujeres juchitecas. Los resultados refieren que el análisis temático identificó que los factores estructurales, psicosociales y culturales se relacionan entre sí y es difícil separarlos, estos interactúan constantemente influyendo en la asistencia a la toma de la citología cervical. Se identificaron barreras de tipo estructural, psicosocial y cultural para la toma de la citología cervical a partir del discurso de los participantes<sup>15</sup>.

Jiménez K., (2016), Ecuador, la investigación tiene como objetivo de explicar los factores que se relacionan con la resistencia para realizarse el examen de cáncer cérvico-uterino, en una muestra de 330 mujeres mayores de 18 con vida sexual activa. Los resultados refieren presencia de mitos sobre la prueba, así como escaso conocimiento sobre la importancia del examen.<sup>16</sup>

Verdezoto B., (2015), Ecuador, la investigación tiene la finalidad de medir el conocimiento del cáncer de cérvix y la percepción que se tiene con respecto a la aceptación del examen cérvico-uterino, en una muestra de 50 mujeres. Los resultados muestran el bajo interés por la realización de la prueba, desconocimientos de la utilidad del examen, así como factores psicológicos relacionados al miedo y pudor, así como influencia de tipo económicos.<sup>17</sup>

A nivel nacional Olaza, M. y De la Cruz, R. (2018), Perú, realizan una investigación sobre las principales limitaciones a la no aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres de zonas rurales, en una muestra de 892 mujeres en edad fértil. Los resultados obtenidos refieren que el 52% rechazaron el examen de detección de cáncer cervical. Las limitaciones para la no aceptación del examen estaban relacionadas a factores sociodemográficas (edad, estado civil, nivel de educación, ocupación), asimismo manifestaban antecedentes en la calidad de atención y maltrato por parte del personal de salud, sentimientos de pudor y desconocimiento de la importancia de los exámenes.<sup>18</sup>

Feria M. (2018), Lima, desarrolla su investigación con una muestra de 353 mujeres, pacientes atendidas en el Hospital Sergio Bernales; el objetivo es medir los conocimientos que tienen del examen y las actitudes con respecto a la evaluación del cuello uterino. Los resultados refieren, que la mayoría de los entrevistados presentan bajos conocimientos sobre el cáncer de cuello uterino, así como actitudes desfavorables al examen y desconfianza a la evaluación por parte de los médicos.<sup>19</sup>

Vásquez, K. (2016), realiza su investigación con una muestra de 130 mujeres de edad fértil en el Hospital Sergio Bernales en Lima; su finalidad es identificar cuales los factores asociados de riesgo al examen de Papanicolaou. La investigación concluye que entre los factores asociados de riesgo se encuentran la educación y factores socioculturales, desconocimiento del examen y la indiferencia con los resultados.<sup>20</sup>

Alcalde K. (2016), realiza una investigación con la finalidad de medir conocimientos, actitudes y prácticas en Papanicolaou en una muestra de 427 mujeres en edad fértil en tres asentamientos humanos. Los resultados refieren que la mayoría desconoce la importancia del examen y la baja administración voluntaria del examen, por lo que recomiendan programas de educación del examen en los asentamientos humanos de Chimbote.<sup>21</sup>

Calderón K., Patazca, J. y Soto, V. (2018), Lambayeque, realizan una investigación con la finalidad de estudiar los factores influyentes en la determinación del examen de Papanicolaou en mujeres de 20 a 69 años de edad, en una muestra de 384 mujeres. Los resultados refieren que existen factores que motivan la abstención de la prueba PAP y estos a su vez, se relacionan a los factores biográficos, educativos y factores socioculturales.<sup>22</sup>

Delgado, J. (2015), en una investigación realizada en una muestra de 375 pacientes mayores de 18 años, atendidas en el Hospital Regional Docente “Las Mercedes” de Chiclayo; con el objetivo de medir el nivel de conocimiento sobre la prueba de Papanicolaou. Los resultados muestran que solo el 40% tienen información de la importancia de la prueba, el 60% presentaron percepción desfavorable de la práctica

del examen y un 53% manifiestan insatisfacción con la atención recibida durante la administración del examen.<sup>23</sup>

### **1.3. Teorías relacionadas al tema**

#### **Teoría de Promoción de la Salud de Nola Pender**

Esta teoría permite comprender la conducta de los seres humanos asociados a la salud. En el Modelo, la autora propone promover un cambio óptimo de salud con acciones netamente preventivas y para ello recomienda identificar los factores que lo promueven.<sup>24</sup>

Según, Sakraida, T., considera que, en la aplicación del Modelo de Promoción de la Salud de Pender, se debe considerar tres aspectos para entender en los seres humanos y de esta manera comprenderlo mejor y prevenir conductas perjudiciales<sup>24</sup>. Así tenemos, las características y experiencias individuales únicas que perjudican sus acciones posteriores; las interpretaciones producto de las características individuales (biológicas, psicólogos y socioculturales) que pueden influir en la conducta y los resultados conductuales<sup>24</sup>. Recomienda trabajar sobre los tres procesos al momento de la implementación del modelo basado en el comportamiento de salud<sup>24</sup>. Finalmente, refiere que la propuesta de Nola Pender, considera a la persona como un ser completo, con fortalezas y capacidades para aceptar sus decisiones con respecto a su salud y su vida.<sup>24</sup>

#### **Factores culturales**

Estos factores influyen en el comportamiento humano y como se ha observado en varias investigaciones, están relacionadas con las decisiones de las mujeres de la puesta en práctica o no de los exámenes del PAP<sup>25</sup>. Los factores culturales son condiciones determinantes que reportan cualidades de las conductas humanas, por eso la mayoría de decisiones tomadas se basan en algún factor cultural del entorno, como las tradiciones, creencias, las costumbres, educación, valores y la religión<sup>25</sup>. En resumen, los factores culturales influyen en su relación con los servicios de salud y sobre todos en la práctica del examen del Papanicolaou.<sup>25</sup>

## **Factores psicológicos**

También, son factores que influyen en la abstención del examen están relacionados a factores psicológicos, como la timidez y la vergüenza en las mujeres, y esto se debe a algunos casos de asistencia de hombres como especialistas en la atención del PAP, vergüenza y miedo a exponer sus partes íntimas con personas del sexo opuesto. Asimismo, el olvido o la indiferencia por los resultados el examen.<sup>25</sup>

## **Factores socioculturales**

Entre los factores socioculturales que influyen en las mujeres para la decisión de la práctica del PAP, son los factores demográficos como: edad de la mujer, estado civil y la formación educativa.<sup>25</sup>

## **Renuencia al examen del papanicolaou**

Según la real academia española renuencia lo define como resistencia a hacer algo, en este caso son las mujeres que se oponen a realizarse el examen del PAP.<sup>26</sup>

## **Definición de Papanicolaou**

El examen de Papanicolaou también conocida como citología vaginal que se utiliza para detectar anomalías del cuello uterino<sup>27</sup>. El objetivo de este examen, es encontrar los cambios de las células del cuello uterino y de esta manera prevenir el cáncer. Algunos autores recomiendan que las mujeres se deben realizar periódicamente, sobre las mujeres sexualmente activas durante dos o tres años consecutivos<sup>27</sup>.

## **Historia del Papanicolaou**

En 1928, George Papanicolaou médico patólogo, descubrió que las células obtenidas de la superficie del cuello del útero, mostraban cambios que dejaban al descubierto células cancerígenas. Este autor fue un pionero en citología y detección temprano de cáncer conocida como prueba de PAP.<sup>28</sup>

## **Frecuencia del examen del Papanicolaou**

Según, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, recomiendan que las pruebas se deben iniciar pasados los tres años desde que se iniciaron en la práctica de



las relaciones sexuales y repetirlos cada tres años después de los 30 años de edad, con la finalidad de detectar y prevenir el cáncer cervical<sup>29</sup>.

Así mismo las mujeres después de los 65 años de edad que han llevado con normalidad los exámenes de Papanicolaou y no se encontró ninguna dificultad durante 10 años en consulta con el especialista pueden decidir suspender los exámenes de diagnóstico <sup>29</sup>

### **Procedimiento para el examen del Papanicolaou**

Se indica que el procedimiento es bastante sencillo e inofensivo, donde el especialista introduce un espéculo de plástico o metal en el interior de la vagina y luego mediante un raspado ligero con una espátula, se obtiene una muestra de células y mucosidad de la exocérvix.<sup>30</sup>

### **Condiciones para el examen del Papanicolaou**

Para que se realice la prueba de Papanicolaou es esencial que las mujeres no estén menstruando, generalmente se realiza 10 días después del inicio de la menstruación, importante que las mujeres no hayan tenido relaciones sexuales 48 horas antes del examen del PAP, no haber ingerido o usado óvulos o cremas vaginales 8 días antes de la toma y no realizarse duchas vaginales previas.<sup>30</sup>

### **Precauciones para el examen del Papanicolaou**

Se debe explicar al paciente el procedimiento a realizar por muchas razones, una de ella es disminuir la ansiedad frente a estos exámenes. Así mismo se recomienda utilizar con precaución el cepillo endocervical en mujeres embarazadas por el riesgo de aborto y en mujeres post-parto o post-legrados, realizar un estudio después de los 3 a 6 días luego del legrado.<sup>30</sup>

### **Resultados del examen del Papanicolaou**

A pesar de tener como resultado un examen negativo, se recomienda realizar un nuevo examen después de 3 años, también si el resultado señala que la muestra fue incorrecta se repite la toma en 90 días y si la muestra indica lesión intraepitelial escamosa B, el

profesional especialista hace una evaluación ginecológica, donde sus controles citológicos son 6 meses durante 2 años, si durante este tiempo la lesión se mantiene o progresa se remitirá a la paciente a una unidad de Colposcopia.<sup>31</sup>

Así mismo, si el resultado muestra lesión intraepitelial escamosa A, es recomendable transferir al paciente a un hospital para una colposcopia, y si el resultado indica carcinoma invasor se necesario el respectivo tratamiento.<sup>31</sup>

### **Definición de términos**

- **Papanicolaou (PAP).** Es un examen que los especialistas suelen realizar para analizar las células tanto exocervicales como endocervicales del cuello uterino con la finalidad de detectar anomalías vaginales y cervicales que pueden provocar displasia e inflamación en la mujer.
- **Factores sociodemográficos.** Se refiere a factores como la edad, nivel educativo, ocupación y religión de la población en estudio.
- **Factores socio culturales.** Son los factores relacionados a las creencias, prejuicios, valores y actitudes que tiene nuestra población en estudio con respecto a la toma de prueba de Papanicolaou.
- **Usuaría.** Hace mención a las personas que forman nuestra población en estudio; es decir, las personas a quienes se le administro el cuestionario de la prueba de Papanicolaou.

### **1.4. Formulación del Problema**

¿Cuáles son los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019?

## **1.5. Justificación**

Según investigación en enfermería reportadas, observamos que el cáncer cervical-uterino, es la segunda causa de muerte en el Perú y cada año se estima que se diagnostican (MINSA, 2019) más de 66,000 casos nuevos de cáncer y fallecen más de 32,000 personas por esta enfermedad. Disminuirá la mortalidad si se diagnosticara en forma oportuna a través del examen de Papanicolaou, motivo por cual el propósito de determinar los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019.

Con los resultados el Centro de Salud podrá establecer estrategias de sensibilización, promoción y educativas con la finalidad de disminuir la incidencia de este mal en las mujeres de la región, así como para la universidad desarrollar charlas de prevención en el público femenino y de esta manera prevenir desenlaces mortales.

Se estima que el presente estudio, será un aporte para otras investigaciones sobre los factores socioculturales que influyen en la renuencia al examen de Papanicolaou; así como, el incremento del nivel de conocimiento del cáncer del cuello en usuarias atendidas en las instituciones de salud. Todo ello, en concordancia con las investigaciones y recomendaciones sobre el control del cáncer de cuello uterino, quien se encuentra entre las intervenciones prioritarias en todo el mundo.<sup>32</sup>

## **1.6. Hipótesis**

Si existe relación significativa entre los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019

## **1.7. Objetivos**

### **1.7.1 Objetivo general**

Determinar el nivel de relación entre los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019

### **1.7.2 Objetivos específicos**

- Identificar factores sociodemográficos influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019.
- Identificar factores culturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019.
- Determinar los conocimientos de las usuarias sobre el examen de Papanicolaou brindado en el Centro de Salud Sector II la Victoria-2019.

## **II. MATERIAL Y MÉTODO**

### **2.1 Tipo y Diseño de Investigación**


#### **2.1.1 Tipo de investigación**

Se utilizó un tipo de investigación descriptivo, porque a través de ella se describen los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019.

Es un estudio no experimental transversal, porque recolectó datos en un solo momento, en un tiempo único, lo que permitió extraer conclusiones acerca de los fenómenos a través de una población.

#### **2.1.2 Diseño de investigación**

El diseño de esta investigación es correlacional, porque tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre la variable factores socioculturales y la variable renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019.



Donde:

**M** = Usuaris del Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019

**O<sub>1</sub>** = Factores socioculturales influyentes.

**O<sub>2</sub>** = Renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019

**r** = Correlación entre ambas variables.

## 2.2 Población y muestra

### 2.2.1 Población

Estuvo conformada por 198 usuarias, número programado para el Centro de Salud la Victoria Sector II – Año 2019 por la GERESA – Lambayeque.

#### Criterios de inclusión

- Toda mujer que se atiende en los diferentes servicios del centro de Salud La Victoria Sector II.
- Mujer mayor o igual a 18 años y menor o igual a 65 años.
- Mujer que acepte participar del estudio.
- Mujer que haya iniciado relaciones sexuales.

#### Criterios de exclusión

- Mujer menor de 18 años o mayor de 65 años.
- Mujeres que no aceptaron participar en el estudio
- Mujeres diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental.

### 2.2.2 Muestra

La muestra fue conformada por 99 usuarias atendidas en el Centro de Salud La Victoria Sector II.

El tamaño de la muestra se determinó con la formula siguiente:

**n:** Muestra

**N:** Población

**ME=** Margen de Error 0.07

**Z=** Nivel de Confianza 1,96

**PYQ =** 0.5 O 50%.

$$n = \frac{N \times Z^2 \times P \times Q}{[ME^2 (N - 1)] + Z^2 (P)(Q)}$$

Reemplazando:

$$n = \frac{198 \times 1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{[0,07^2 (198 - 1)] + 1,96^2 (0,5) (0,5)}$$

$$n = 99 \text{ usuarias para la muestra.}$$

### 2.3. Variables, Operacionalización

Esta investigación estuvo conformada por dos variables que fueron factores socioculturales y renuencia al examen del papanicolaou, las mismas que se dividen en distintas dimensiones que se muestra en la tabla de operacionalización de variables.

**Tabla 1**

Operacionalización de variable Factores socioculturales

Variables	Dimensiones	Indicadores	Item	Técnica e instrumentos de recolección de datos
	Factores demográficos	Edad Estado civil Nivel de instrucción Ocupación Religión	¿Qué edad tiene usted? ¿Cuál es su estado civil? ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? ¿Cuál es su ocupación? ¿A que religion pertenece? ¿Tiene usted alguna creencia sobre la toma de papanicolaou? ¿El papanicolaou solo se toma si hay alguna molestia, porque puede provocar flujo? ¿Si se toma el papanicolaou va sentir dolor y provocar sangrado? ¿Tomarse el papanicolaou y mostrar sus partes intimas, es una ofensa para la mujer(vergüenza) ¿Si se toma el papanicolaou le puede ocasionar una infección?	
Factores Socioculturales	Factores culturales	Creencias	¿Durante la toma de papanicolaou, sacan un pedazo de cuello uetrino? ¿Solo las mujeres que tienen parejas sexuales deben hacerse el papanicolaou? ¿Solo las mujeres que tienen hijos deben hacerse el papanicolaou? ¿Es necesario que la pareja este de acuerdo conque se realice el papanicolaou? ¿ Realizar la toma de papanicolaou es costoso? ¿Si tienes una sola pareja sexual (esposo o convivientenodbes realizarte la toma de papnicolaou?.	Encuesta/Cuestionario

Fuente: elaboración propia

**Tabla 2**

Operacionalización de variable Renuencia al examen de Papanicolaou

Variables	Dimensiones	Indicadores	Item	Técnica e instrumentos de recolección de datos
Renuencia al examen del papanicolaou	Nivel de Conocimiento	Concepto de papanicolaou.	¿Qué es el examen del papanicolaou?	Encuesta/Cuestionario
		Lugar donde se debe realizar el examen del papanicolaou	¿Dónde se debe realizar el examen del papanicolaou?	
		Frecuencia del examen del papanicolaou	¿Con que frecuencia se practica el examen del papanicolaou?	
		Beneficios del papanicolaou en la salud	¿Qué beneficios aporta este examen de papanicolaou en la salud?	

Fuente: elaboración propia

## 2.4. Método

**Método deductivo:** según estudio realizado por (Dávila, 2006), menciona que por medio de este procedimiento se organizan hechos conocidos y se extraen conclusiones, mediante una serie de enunciados deductivos que comprenden de lo general a lo particular dando como obtención las conclusiones.<sup>33</sup>

Este método se aplica en base a los antecedentes internacionales, nacionales y locales, posteriormente se plantea la situación problema, se verifica los hallazgos y las conclusiones.

## 2.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad

**Técnica:** La Encuesta

**Instrumento:** Cuestionario



### **Validez y confiabilidad**

El instrumento se validó por 3 profesionales expertos, quienes tienen más de 5 años de experiencia y el grado de magister, los mismos que harán las correcciones para ser aplicado a los profesionales de enfermería.

Mg. Rosa Villafranca Velásquez

Mg. María Díaz Coronel

Mg. Rocio del Carmen Gamonal Cruz

La prueba piloto se realizó a 20 usuarias del centro de salud sector II la Victoria-2019 que representan el 10 % de la población, la cual fue estimada el alfa de Cronbach en 0,9; lo que indica que es confiable en las cuales se reunió los criterios de inclusión con el fin de que las respuestas de la encuesta tengan confiabilidad y validez.

El nivel de confiabilidad alfa de Cronbach es fuente para el instrumento realizado como resultado 0,759 de confiabilidad.

### **Confiabilidad del Alfa de Cronbach**

#### **Resumen de procesamiento de casos**

		N	%
Casos	Valido	20	100,0
	Excluido <sup>a</sup>	0	,0
	Total	20	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

### **Estadísticas de fiabilidad**

Alfa de Cronbach	N de elementos
,759	24

## **2.6 Procedimiento de análisis de datos**

Tanto para el análisis descriptivo de los datos como para el procesamiento se empleó el programa estadístico SPSS versión 23.

## **2.7 Criterios éticos**

Priman en la investigación principios éticos de la profesión en materia de investigación, y fueron las siguientes: Beneficencia (no exponer a daños y asegurando el bienestar de los participantes), no maleficencia (no infligir daño a los participantes en el estudio, el principio de respeto (autonomía) y Justicia seres humanos son iguales y deben tratarse con la misma consideración y respeto.

## **2.8. Criterios de Rigor Científico**

La variable de estudio ha pasado por un proceso estadístico de validez y confiabilidad realizado por el autor, donde asegura la fiabilidad de los datos; a su vez cada prueba ha sido codificada y protegida para evitar alguna confusión. El número de colaboradores que participaron en esta investigación para la prueba piloto estuvo conformado por las 20 personas, quienes sirvieron para el estudio piloto en cuanto a la validación y confiabilidad de ambos test, ayudando de esta forma al control y manejo del grupo. Así mismo, el número utilizado para la investigación fue de 99 personas.

### III RESULTADOS

#### 3.1 Resultados de tablas y figuras

3.1.1. Identificar factores sociodemográficos influyentes al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019.


**Tabla 3.** *Edades de las usuarias encuestadas*

Edad	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
15-22	8	8.1	8.1	8.1
23-30	19	19.2	19.2	27.3
31-38	23	23.2	23.2	50.5
39-46	20	20.2	20.2	70.7
47-54	23	23.2	23.2	93.9
55 a mas	6	6.1	6.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

*Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019*

Se indica que el 23.2 % de las usuarias atendidas en el Centro de Salud tienen sus edades de 31 a 38 años; 23.2 % de 47 a 54 años; 20.2% de 39 a 46 años; 19.2% de 23 a 30 años; 8.1% de 15 a 22 años y el 6.1% de 55 años a más. En resumen, observamos que la mayor proporción de usuarias están entre 31 a 54 años de edad.

**Figura 1.** *Estado civil de las usuarias encuestadas*



*Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019*

Teniendo en cuenta el estado civil de las encuestadas, se reporta, que el 46.5% es conviviente; el 28.3% casadas; el 21.2% son solteras y en menor proporción 3 % viudas y 1 % divorciadas.


**Tabla 4.** Nivel de instrucción de las usuarias encuestadas

Instrucción	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Sin instrucción	2	2.0	2.0	2.0
Primaria	13	13.1	13.1	15.2
Secundaria	53	53.5	53.5	68.7
Técnico	20	20.2	20.2	88.9
Universitario	11	11.1	11.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Teniendo en cuenta los datos reportados sobre el nivel de instrucción de las usuarias encuestadas, se indica que el 53.5% tienen nivel de instrucción secundaria; el 20.2% nivel de instrucción técnico; el 13.1% nivel de instrucción primaria y el 11.1% nivel de instrucción universitario y 2 % sin instrucción.

**Figura 2.** Actividad ocupacional de las usuarias encuestadas



Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Según las respuestas formuladas por las encuestadas, indican que el 70.7% tienen como ocupación ser ama de casa; el 25.3% refiere tener trabajo independiente y el 4% refiere ser trabajador dependiente.

**Tabla 5.** Religión que profesan las usuarias encuestadas


Religión	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Católica	77	77.8	77.8	77.8
Evangélica	14	14.1	14.1	91.9
Otros	8	8.1	8.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Las usuarias encuestadas en el presente estudio indican en un 77.8% que profesan la religión católica; el 14.1% la religión evangélica y el 8.1% profesan otras religiones.

**3.1.2.** Identificar factores culturales al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II-La Victoria -2019

**Figura 3.** Creencias con respecto al examen de Papanicolaou



Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Las usuarias encuestadas indican en un 52.5% refiere tener creencias con respecto al examen de Papanicolaou; el 47.5% refiere que no tiene creencias al respecto.


**Tabla 6.** Creencias con respecto al examen de Papanicolaou

Molestias	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	16	16.2	16.2	16.2
No	83	83.8	83.8	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Se reporta que el 83.8% de las encuestadas tienen creencias que el examen de Papanicolaou no ocasiona molestias y el 16.2% tiene la creencia que si ocasiona molestias.

**Figura 4.** Creencias con respecto a sentir dolor y sangrado en el examen de Papanicolaou



Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Las usuarias encuestadas refieren en un 80.8% no sentir dolor ni ocasiona sangrado durante el examen de Papanicolaou y el 19.2% tiene la creencia que si siente dolor y ocasiona sangrado.


**Tabla 7.** Creencia con respecto a mostrar sus partes íntimas es ofensa y vergüenza en el examen de Papanicolaou.

Ofensa y vergüenza	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	16	16.2	16.2	16.2
No	83	83.8	83.8	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Las usuarias encuestadas indican en un 83.8% no sentir ofensa y vergüenza durante el examen de Papanicolaou; a diferencia del 16.2% refiere tener creencias que si es ofensivo y se genera vergüenza.

**Figura 5.** Creencias con respecto a contraer infecciones en el examen de Papanicolaou



Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

El 91.9% de las usuarias encuestadas indican no se contraen infecciones en el examen de Papanicolaou; mientras que el 8.1% refiere que si se pueden contraer infecciones.


**Tabla 8.** Creencias que le pueden afectar en el cuello uterino en el examen de Papanicolaou

Afecta el cuello uterino	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	4	4.0	4.0	4.0
No	95	96.0	96.0	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

De las usuarias encuestadas, éstas indican en un 96% que el examen de Papanicolaou no afecta el cuello uterino; mientras que 4% manifiesta todo lo contrario.

**Figura 6.** Creencias si se tiene pareja sexual deben hacer el examen de Papanicolaou



Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Las usuarias encuestadas en un 68.7% consideran no necesariamente tener pareja sexual para hacerse un examen de Papanicolaou y el 31.3% refieren que si se tiene pareja sexual deben hacer en examen de Papanicolaou.




**Tabla 9.** Creencias que sólo las mujeres que tienen hijos deben hacerse el examen de Papanicolaou

Mujeres que tienen hijos	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	16	16.2	16.2	16.2
No	83	83.8	83.8	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Teniendo en cuenta los datos reportados, el 83.8% indican que no solo las mujeres que tienen hijos deben hacerse el examen de Papanicolaou y el 16.2% tienen la creencia que solo las mujeres que tienen hijos deben hacerse el examen de Papanicolaou.

**Figura 7.** Creencias que la pareja este de acuerdo para el examen de Papanicolaou



Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

De las usuarias encuestadas, el 83.8% refieren que la pareja no necesariamente debe estar de acuerdo para hacerse el examen de Papanicolaou; mientras que el 16.2% tienen la creencia que si debe estar de acuerdo la pareja para hacerse el examen de Papanicolaou.


**Tabla 10.** Creencias que el examen de Papanicolaou es costoso

Es costoso la muestra	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	4	4.0	4.0	4.0
No	95	96.0	96.0	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria -2019

Se observa, que el 96% refieren que el examen de Papanicolaou no es costoso y el 4% tienen la creencia que es si es costoso.

**Figura 8.** Creencias si tienen una sola pareja sexual (esposo o conviviente) no debes realizarte el examen de Papanicolaou



Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019

Se observa, que el 59.6% consideran que si tienes una sola pareja sexual (esposo o conviviente) no se deben realizar el examen de Papanicolaou y el 40.4% refieren que se deben hacer el examen de Papanicolaou.


**Tabla 11.** *Número de parejas sexuales*

Número de parejas sexuales	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
0	7	7.1	7.1	7.1
1	48	48.5	48.5	55.6
2	33	33.3	33.3	88.9
3	10	10.1	10.1	99.0
4	1	1.0	1.0	100.0
Total	99	100.0	100.0	

*Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019*

Las usuarias encuestadas indican que el 48.5% haber tenido solo una pareja sexual; el 33.3% dos parejas sexuales, el 10.1% manifiesta haber tenido tres parejas sexuales, el 7.1% refieren no haber tenido parejas y finalmente el 1% haber tenido cuatro parejas sexuales.

**Figura 9.** *Número de hijos que tienen las usuarias encuestadas*



*Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019*

Las usuarias encuestadas indican en un 30.3% tener de 3 a 4 hijos; el 28.3% de 1 a 2 hijos; el 16.2% de 5 a 6 hijos; el 11.1% 4 hijos; el 7.1% refieren no tener hijos; el 4% tienen 5 hijos y el 3% 6 hijos.


**Tabla 12.** *Edad de inicio de las relaciones sexuales*

Inicio de relaciones sexuales	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
15-22	74	74.7	74.7	74.7
23-30	22	22.2	22.2	97.0
31-38	3	3.0	3.0	100.0
Total	99	100.0	100.0	

*Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019*

Las encuestadas refieren que el 74.7% haber iniciado las relaciones sexuales entre las edades comprendidas de 15 a 22 años; el 22.2% entre los 23 y 30 años y el 3% después de los 31 años.

**Figura 10.** *Periodo de tiempo que no asiste a un examen de Papanicolaou*



*Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019*

Las usuarias encuetadas refieren en un 73.7% que se han realizado el examen de Papanicolaou durante un periodo menor a 3 años; mientas que el 26.3% no lo realiza en periodos mayor a tres años.

**3.1.3.** Determinar los conocimientos sobre el examen de Papanicolaou del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019


**Tabla 13.** *Conocimiento del examen de papanicolaou*

Conocimiento del examen	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Es un método para detectar células cancerígenas en los ovarios	26	26.3	26.3	26.3
Es un examen para detectar cáncer del cuello uterino	59	59.6	59.6	85.9
Es un examen para detectar si la mujer es fértil	3	3.0	3.0	88.9
Es un examen de laboratorio para saber si hay infección del útero	11	11.1	11.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

*Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019*

Las encuestadas en un 59.6% indican que el examen de Papanicolaou es un examen para detectar cáncer del cuello uterino, el 26.3% consideran que es un método para detectar células cancerígenas en los ovarios; el 11.1 % es un examen de laboratorio para saber si hay infección del útero y el 3% un examen para detectar si la mujer es fértil. Como observamos en las respuestas solo el 59.6% tiene conocimientos precisos de la prueba.

**Figura 11.** *Conocimiento sobre lugar a realizarse el examen de Papanicolaou*



*Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019*

De los datos reportados en la encuesta se puede indicar que el 55.6% refieren que el lugar donde deberían realizarse el examen de Papanicolaou es en un Centro de Salud; el 32.3% en indicó en un Puesto de Salud y el 11% respondió en un Hospital.


**Tabla 14.** Conocimiento sobre periodo de tiempo para realizarse el examen de Papanicolaou

Periodo de tiempo	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Una vez al año	71	71.7	71.7	71.7
Dos veces al año	19	19.2	19.2	90.9
Tres veces al año	9	9.1	9.1	100.0
Total	99	100.0	100.0	

Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019

Refiere el 71.7% de las encuestadas, que el periodo de tiempo para realizarse el examen de Papanicolaou es una vez al año; el 19.2% dos veces al año y el 9.1% tres veces al año. Los resultados muestran desconocimiento por parte de las usuarias sobre la fecha recomendada por los especialistas para la realización del examen de Papanicolaou.

**Figura 12.** Conocimientos sobre los beneficios del examen de Papanicolaou en la salud



Fuente: Encuesta aplicada a las usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019

El 83.8% de las usuarias encuestadas consideran que el examen de Papanicolaou previene de padecer cáncer de cuello uterino; el 15.2% previene de las enfermedades de transmisión sexual y el 1% de las usuarias refieren que previene el contagio con algún virus. Los resultados muestran que el 16.2 % de las usuarias no tienen conocimientos de los beneficios del examen.

### 3.2 Discusión de resultados

Se muestra los hallazgos en general y se discute usando la teoría relacionada al tema y los trabajos previos. El objetivo general de la investigación es determinar el nivel de relación entre los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019.

En los factores sociodemográficos la mayor proporción de las usuarias tienen edades entre 31 a 54 años de edad, de estado civil conviviente (46.5%), de instrucción secundaria (53.5%), ocupación ama de casa (70.7%) y de religión católica (77.8%). En cuanto a los factores culturales relacionados al examen del Papanicolaou en su mayoría considera que no ocasionan molestias, ni dolor, ni sangrado, no es ofensivo y no genera vergüenza por la exposición de las partes íntimas y no puede ocasionarle infecciones. En cuanto al conocimiento sobre el examen de Papanicolaou, en su mayoría de las usuarias encuestadas consideran que es un examen para detectar cáncer del cuello uterino (59.6%). Con características comunes se encontró en la investigación perteneciente a Gonzales Trujillo (2015), en una investigación realizada en Trujillo. Los resultados refieren que las usuarias se abstienen con frecuencia de realizarse el examen por factores socioculturales y niveles económicos. Asimismo, Delgado J. (2015) en la investigación realizada en Chiclayo con la finalidad de evaluar el nivel de conocimiento sobre la prueba de Papanicolaou. Los resultados muestran que solo el 40% tienen información de la importancia del examen, el 60% presentaron percepción desfavorable de la práctica del examen. Comey, C. (2015) refiere que el examen de Papanicolaou es un procedimiento que se usa para adquirir células del cuello uterino y efectuar la citología cervical y se utiliza para detectar anomalías del cuello uterino. Como observamos la práctica de los exámenes de Papanicolaou se ve influencia por factores cognoscitivos, culturales, sociales, educativos y psicológicos.

Al identificar factores sociodemográficos influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019, se observó que la mayor proporción de ellas tienen entre las edades de 31 a 54 años

de edad, de estado civil conviviente (46.5%), de instrucción secundaria (53.5%), ocupación ama de casa (70.7%) y de religión católica (77.8%). Al respecto, Vásquez K. (2016), en una investigación realizada en Lima sobre los factores asociados al examen de Papanicolaou, en una muestra de 130 mujeres de edad fértil en el Hospital Sergio Bernales, obtiene resultados que muestran que los factores asociados de riesgo se encuentran en los factores sociodemográficos. Asimismo, Jiménez K., en el 2016 una investigación realizada en el Ecuador, con la finalidad de identificar los factores que influyen en la resistencia para realizarse el del examen de cáncer cérvico-uterino, en una muestra de 330 mujeres mayores de 18 años de edad que tienen vida sexual activa. Los resultados refieren presencia de factores sociodemográficos y mitos sobre la prueba, así como escaso conocimiento sobre la importancia del examen. Verdezoto B., (2015), en la investigación realizada en Ecuador con la finalidad de medir el conocimiento del cáncer de cérvix y la percepción que se tiene con respecto a la aceptación del examen cérvico-uterino, en una muestra de 50 mujeres. Los resultados muestran el bajo interés por la realización de la prueba asociados a factores sociodemográficos. Cuando nos referimos a factores sociodemográficos, estamos relacionándolos con la edad, nivel educativo, ocupación y religión de la población en estudio. Y como observamos de acuerdo a los resultados y las investigaciones previas los usuarios con bajo grado de instrucción tienen mayores creencias negativas del uso del examen.

Al Identificar factores culturales influyentes a la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019, observamos que el 83.8% refiere el examen de Papanicolaou no ocasiona molestias; el 80.8% , indica que no se siente dolor ni ocasiona sangrado; el 83.8% manifiesta que no se siente como ofensivo y no genera vergüenza por la exposición de las partes íntimas; el 91.9% estima que el examen de Papanicolaou no puede ocasionarle infecciones; el 96% refiere que el examen no afecta el cuello uterino; el 68.7% manifiesta no necesariamente se tiene que tener pareja sexual para hacer realizarse el examen de Papanicolaou; el 83.8% considera que no solo las mujeres que tienen hijos deben hacerse éste examen; el 83.8% hace alusión que debe de estar de acuerdo la pareja para realizarse el examen de Papanicolaou, el 96% refieren que el examen de Papanicolaou no es



costoso y el 4% tienen la creencia que es costoso; el 59.6% consideran que si tienes una sola pareja sexual (esposo o conviviente) no se deben realizar el examen de Papanicolaou. Al respecto, Félix, A. y De la Cruz, Y (2018), en una investigación realizada en el Perú, sobre las principales limitaciones para la no aceptación del examen de Papanicolaou en mujeres en zonas rurales, en una muestra de 892 mujeres en edad fértil. Los resultados obtenidos refieren que la mayoría rechazaron la prueba relacionado a factores culturales. Similar resultado encontró Feria M. (2018), en la investigación realizada en Lima en una muestra de 353 mujeres, pacientes de un hospital, con el objetivo de medir los conocimientos que tienen del examen y las actitudes con respecto a la evaluación del cuello uterino. Como hemos observado los factores culturales influye en el comportamiento humano y como hemos observado en varias investigaciones, están relacionadas con las decisiones de las mujeres de la puesta en práctica o no de los exámenes del PAP. (Medrano, S. 2015). Los factores culturales son condiciones determinantes que reportan cualidades de las conductas humanas, por eso la mayoría de decisiones tomadas se basan en algún factor cultural del entorno, como las tradiciones, creencias, las costumbres, educación, valores y la religión. Factores socio culturales, son los factores relacionados a las creencias, prejuicios, valores y actitudes que tiene nuestra población en estudio con respecto a la toma de prueba de Papanicolaou.

Cuando se buscó medir los conocimientos sobre la renuencia al examen de Papanicolaou del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019. Se observa, que el 59.6% de las usuarias consideran que sirve el examen para detectar cáncer del cuello uterino; el 26.3% consideran que es un método para detectar células cancerígenas en los ovarios; el 55.6% de los usuarios refieren que el lugar donde deberían realizarse la prueba de Papanicolaou es en un Centro de Salud; el 71.7% de los usuarios refieren que el periodo de tiempo para realizarse el examen de Papanicolaou es una vez al año; el 19.2% dos veces al año y el 9.1% tres veces al año. Los resultados indican que existe un desconocimiento por parte de las usuarias sobre la fecha recomendada por los especialistas para la realización del examen de Papanicolaou; asimismo se observa que el 83.8% de las usuarias consideran que el examen de Papanicolaou previene precozmente el cáncer del cuello uterino y el 15.2% previene de las enfermedades de transmisión

sexual. Al respecto, Feria M. (2018), en la investigación realizada en la ciudad de Lima, cuyo objetivo fue determinar los conocimientos que tienen del examen Papanicolaou y Andrade y Landívar (2017), quien realiza su investigación en el Ecuador, teniendo como objetivo determinar el nivel de conocimiento y las prácticas referente al examen de Papanicolaou; en ambas investigaciones reportan que las usuarias tienen un bajo nivel de conocimiento del examen de Papanicolaou. Alcalde K. (2016), realizó una investigación cuyo objetivo fue medir conocimientos, actitudes y prácticas en Papanicolaou en una muestra de 427 mujeres en edad fértil en tres asentamientos humanos. Los resultados refieren que la mayoría de las investigadas desconocen la importancia del examen.

Ante las evidencias de los resultados analizados y descritos, se infiere la validación de la Hipótesis planteada en la presente investigación, al valorar que “si existe relación significativa entre los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019”.

## IV. CONCLUSIONES

### 4.1. Conclusiones

Se determinó que existe relación significativa entre los Factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou, del total de usuarias encuestadas en el Centro de Salud La Victoria Sector II.

En los factores sociodemográficos se identificó que el 23.2 % de las usuarias tienen edades de 31 a 54 años, 46.5% son convivientes, 53.5% tienen nivel secundario, 70.7% ama de casa y 77.8% católicas.

Se identificó en los factores culturales sobre las creencias al examen de Papanicolaou, 83.8% de las usuarias en su mayoría consideran que no ocasionan molestias, 80.8% no sentir dolor ni sangrado, 83.8% no genera ofensa ni vergüenza por la exposición de sus partes íntimas, 91.9% no ocasionarle infecciones, 83.8% no necesariamente la pareja debe estar de acuerdo, 48.5% haber tenido solo una pareja, 74.7% haber iniciado relaciones sexuales a partir de 15 a 22 años, 73.7% se realizaron el examen en un periodo menor a 3 años.

Finalmente, para determinar los conocimientos de las usuarias renuentes al examen del papanicolaou, 59.6 % indican que es un examen para detectar cáncer del cuello uterino, 71.7% realizan el examen una vez al año, 83.8% consideran que el examen de Papanicolaou previene el cáncer de cuello uterino.

## **V. RECOMENDACIONES**

Al Gerente Regional de Salud y al responsable de la Estrategia Sanitaria de Cáncer de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, promover actividades educativas preventivas promocionales con herramientas adecuadas, mensajes claros y materiales de apoyo dirigidas a las usuarias del Centro de Salud La Victoria Sector II, para reducir de esta manera la renuencia al examen del papanicolaou.

Al Médico Jefe del Centro de Salud La Victoria Sector II, establecer pautas para la prevención y detección precoz del cáncer de cuello uterino, realizando campañas periódicas de la toma del examen del papanicolaou en los sectores de su jurisdicción. Asimismo, sensibilizar e incentivar a todo el personal de salud poniendo interés en aumentar las coberturas de dicho examen a fin de reducir la morbimortalidad de las mujeres.

Al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y docentes de la Universidad Señor de Sipán, a incentivar a los estudiantes en fomentar mayor investigación acerca de las actitudes, creencias, conocimientos y otras barreras de renuencia sobre el examen del papanicolaou.

## VI. REFERENCIAS

1. Academia Americana de Médicos familiares. Pruebas de Papanicolaou. Madrid: Consumer Repors Health; 2016, disponible [15/03/2019]. Recuperado: [http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2840/T033\\_47311422\\_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2840/T033_47311422_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
2. Sociedad Americana del Cáncer. El Cáncer uterino, [20/11/2016], disponible [15/03/2019]. Recuperado: <https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-cuello-uterino/prevencion-y-deteccion-temprana/que-es-cancer-de-cuello-uterino.html>.
3. Sociedad Americana del Cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino?, [16/11/2016], disponible [15/03/2019]. Recuperado: <https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-cuello-uterino/causas-riesgos-prevencion/factores-de-riesgo.html>
4. Organización Panamericana de la Salud. Cáncer Cervicouterino, [12/01/2019], disponible [15/03/2019]. Recuperado: [https://www.paho.org/hq/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5420:2018-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=es](https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420:2018-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=es)
5. Liga contra el Cáncer. Siete de cada 14 mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino mueren en el Perú, [06/04/2016], disponible [15/03/2019]. Recuperado: <https://peru21.pe/vida/siete-14-mujeres-diagnosticadas-cancer-cuello-uterino-mueren-peru-214845>
6. Organización Mundial de la Salud (OMS). Papiloma virus humanos (PVH) y cáncer cervicouterino. 2018. Disponible [16/03/2019]. Recuperado: [http://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-\(hpv\)-and-cervical-cancer](http://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer)
7. Velasco F. Factores Socioculturales Que Interfieren En La Realización Del Papanicolaou En Mujeres Indígenas Mexicanas. European Scientific Journal. Edition. 2018. (14), No.6. 1857- 7431. Disponible [16/03/2019]. Recuperado:

<http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/277/TESIS%20-%20OLIVOS%20Y%20ZAPATA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
<https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/10517/10050>

8. Camey C. Factores que influyen en la renuencia al examen de Papanicolaou. [Tesis de licenciatura]. Universidad Rafael Landívar. Guatemala. 2015 disponible [16/03/2019]. Recuperado:  
<http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/277/TESIS%20-%20OLIVOS%20Y%20ZAPATA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
9. Centeno Díaz Rosa María, Torres Mendoza Yanoris Massiel “Factores que causan en la no realización del Papanicolaou en mujeres con vida sexual activa, que asisten en las Unidades de Salud del Departamento de Matagalpa, 2015” Tesis de investigación para optar el título de licenciatura en enfermería con orientación en materno infantil, Matagalpa, Nicaragua – 2016. Disponible [30/03/2019]. Recuperado:  
[http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/178/Arevalo\\_Arevalo\\_tesis\\_bac\\_hiller\\_2017.pdf?sequence=7&isAllowed=y](http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/178/Arevalo_Arevalo_tesis_bac_hiller_2017.pdf?sequence=7&isAllowed=y).
10. Ministerio de Salud: Documento Técnico “Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino 2017 – 2021”. RM. 440 - 2017/MINSA. Disponible [30/03/2019]; 1: p.34 Recuperado: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4232.pdf>.
11. Arévalo M. factores sociales, culturales y nivel de conocimiento del examen del Papanicolaou en mujeres que son atendidas en los Centros de Salud de Red Lima Norte V Rímac – San Martín de Porres – Los Olivos, [Tesis de Titulación] Lima. Universidad católica 2017 disponible [05/04/2019]. Recuperado:  
<http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/277/TESIS%20-%20OLIVOS%20Y%20ZAPATA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
12. Oliva Hanke, Claudia. Nivel de conocimiento, actitudes y práctica en la realización del examen de Papanicolaou en mujeres mayores de 15 años que asistieron a consultorio externo de Ginecología del Hospital San José 2015. Disponible [05/04/2019]  
[http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/569/1/Oliva\\_c.pdf](http://cybertesis.urp.edu.pe/bitstream/urp/569/1/Oliva_c.pdf)

13. Cruz E. Factores que limitan la realización del examen de Papanicolaou, según percepción de las mujeres. Chachapoyas. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 2015 disponible [05/04/2019]. Recuperado:  
<http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/277/TESIS%20-%20OLIVOS%20Y%20ZAPATA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
14. Andrade y Landívar (2017) en su tesis Nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre el método de Papanicolaou en pacientes de la consulta externa del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período octubre 2016 a enero 2017. Disponible [10/03/2019]. Recuperado:  
[http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/4086/ACTITUD\\_CONOCIMIENTO\\_MONTES\\_CARDENAS\\_KELLY\\_ARELI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/4086/ACTITUD_CONOCIMIENTO_MONTES_CARDENAS_KELLY_ARELI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
15. Saldaña, T. y Montero, L. Barreras percibidas por el personal de salud para la toma de la citología cervical en mujeres zapotecas de Juchitán, Oaxaca. 2017. Disponible [21/02/2020]. Recuperado: <https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/view/57090>
16. Jiménez K.53 en Ecuador en el año (2016) realizó un ensayo el cual tuvo como objetivo identificar las barreras que influyen en la realización del tamizaje de cáncer cérvico-uterino. Disponible [10/03/2019]. Recuperado:  
[http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/4347/1/RE\\_OBST\\_YOHANA.TORREALVA\\_ACTITUD.NEGATIVA\\_DATOS.PDF](http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/4347/1/RE_OBST_YOHANA.TORREALVA_ACTITUD.NEGATIVA_DATOS.PDF)
17. Verdezoto B. Relación entre el conocimiento del Cáncer de Cuello de Cérnix y Aceptación en la prueba de Papanicolaou en el Hospital Oncológico SOLCA en el periodo Agosto – Diciembre Disponible [19/04/2019]. Recuperado: 2014. [Tesis de titulación]. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador. 2015.  
<http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/277/TESIS%20-%20OLIVOS%20Y%20ZAPATA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

18. Olaza, M. y De la Cruz, Y. Obstáculos a la no aceptación de las pruebas de detección de cáncer cervical (prueba de Papanicolaou) en mujeres en edad fértil en una zona rural del Perú. Barriers to the non-acceptance of cervical cancer screenings (pap smear test) in women of.
19. Feria M. (2018). Conocimientos, actitudes y prácticas respecto al cáncer de cuello uterino en pacientes de consultorios externos del servicio de ginecoobstetricia en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales de octubre a diciembre del 2017. Disponible [20/04/2019]. Recuperado: <http://repositorio.upsjb.edu.pe/bitstream/handle/upsjb/1559/T-TPMC%20Miguel%20Angel%20%20Feria%20Espinoza.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
20. Vásquez, K; (2016), en su investigación: “Factores Asociados a la toma de Papanicolaou de Mujeres en Edad Fértil del Hospital Sergio E. Bernales, Marzo”. Disponible [21/04/2019]. Recuperado: [http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/2359/3/vasquez\\_k.pdf](http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/2359/3/vasquez_k.pdf)
21. Alcalde K. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Papanicolaou en mujeres de tres Asentamientos Humanos-Chimbote, en mujeres en edad fértil de los Asentamientos Humanos Huanchaquito, Manuel Seoane y Urbanización La Caleta. 2016. Disponible [20/04/2019]. Recuperado: [http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/2682/TESIS%20O804\\_Ast.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/2682/TESIS%20O804_Ast.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
22. Calderón K. Patazca J. Soto V. Factores que intervienen en la decisión de la toma de la prueba de Papanicolaou en mujeres de 20 a 69 años del distrito de Lambayeque. Revista Experiencia en Medicina - Hospital Regional Lambayeque Vol. 4 Núm. 2:2018 Disponible [11/05/2019]. Recuperado file:///C:/Users/NATHALY/Downloads/Dialnet-FactoresQueIntervienenEnLaDecisionDeLaTomaDeLaPrue-6559211%20(6).pdf
23. Delgado J. [en línea]. Nivel de Conocimientos, Actitudes y Prácticas Sobre. La Prueba De Papanicolaou en Pacientes Mujeres. Mayores de 18 Años Atendidas en Consulta Externa del Hospital Regional Docente Las Mercedes. [Tesis para Médico Cirujano].



- Universidad San Martín de Porres 2015. Disponible [11/05/2019]. Recuperado.[http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1193/3/Delegado\\_jm.pdf](http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1193/3/Delegado_jm.pdf).
24. Sakraida T. Modelo de promoción de la Salud. Nola J. Pender. En: Raile M, editores. Modelos y teorías en enfermería. Octava edición. España: Ed. Elsevier; 2014; 385 – 404. Disponible [11/05/2019]. Recuperado [file:///C:/Users/NATHALY/Downloads/Modelos\\_y\\_teorias\\_en\\_enfermeria\\_7ed\\_medio%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/NATHALY/Downloads/Modelos_y_teorias_en_enfermeria_7ed_medio%20(1).pdf)
25. Medrano, S.M. Factores Socioculturales y psicológicos que influyen en la decisión de las usuarias para la toma de Papanicolaou del Centro de salud Carlos cueto Fernandini – 2014, [Tesis para Optar el título de Licenciada en Obstetricia]. Perú: Repositorio Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015. Disponible [11/05/2019] Recuperado en: [http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4055/1/Medrano\\_sm.pdf](http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4055/1/Medrano_sm.pdf)
26. Diccionario de la lengua Española. Disponible [11/05/2019] Recuperado URL disponible en: <https://dle.rae.es/renuencia>
27. Shulman, N., Rivera, H., Birge, J. y Ahn, J. Algunas de las señales de alarma de su cuerpo. 2015. New York: Author House Disponible [11/05/2019] Recuperado [http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/28428/Sosa\\_TSE.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/28428/Sosa_TSE.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
28. Roque Agapito, K. C. Conocimientos y actitudes sobre cáncer de cuello uterino relacionados con la toma de Papanicolaou en las usuarias del Centro de Salud San Fernando julio agosto 2014. Disponible [11/05/2019] Recuperado de [http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3161/1/Podesta\\_gl.pdf](http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3161/1/Podesta_gl.pdf)
29. CIAP. Tecnología avanzada en Anatomía Patológica. Papanicolaou. Disponible [11/05/2019] Recuperado en: <Http://ciap-lab.blogspot.com/2011/04/que-es-el-papanicolaou.html>.
30. Agüero, B., García M., Álvarez, G., Montañó, A. y Duran D. Información y actitudes relacionadas con el Papanicolaou en estudiantes de licenciatura, mujeres docentes y

personal administrativo. Disponible [11/05/2019] Recuperado en:  
[Http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-1/RFM49104.pdf](http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-1/RFM49104.pdf)

31. Manual de procedimientos para la toma de la muestra de citología cervical. Primera edición 2006. Mexico D.F. C.P.11570. Disponible [11/05/2019] Recuperado en:  
[http://cneqsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/CaCu/toma\\_muestra.pdf](http://cneqsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/CaCu/toma_muestra.pdf)
32. Nayar R, Wilbur DC. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology. 3rd ed. Suiza: Spring. 2015. Disponible [11/05/2019] Recuperado en:  
<http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/827/TITULO%20-%20Aguilar%20Felix%2C%20Liliana.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
33. Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12, 180-205. [11/06/2019] Recuperado en: <https://www.redalyc.org/pdf/206/20652069006.pdf>
34. Guía para la salud de la mujer. Significado en los cambios del cuello uterino. National Cancer Institute. Publicación de los NIH 17-5199S septiembre de 2017. Disponible[11/06/2019] Recuperado en:  
<https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/educacion-para-pacientes/significado-cambios-en-cuello-uterino.pdf>

## VII. ANEXOS

### ANEXO 1

#### Matriz De Consistencia

TITULO	PROBLEMA	OBJETIVO GENERAL/ESPECIFICOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	TECNICAS E INSTRUMENTOS
Factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019	¿Cuáles son los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019?	<p><b>Objetivo general:</b> Determinar el nivel de relación entre los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> Identificar factores sociodemográficos asociados a la toma de muestra de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019. Identificar factores culturales asociados a la toma de muestra de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019. Determinar los conocimientos de las usuarias sobre la prueba de Papanicolaou del Centro de Salud Sector II la Victoria-2019.</p>	Si existe relación significativa entre los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del Centro de Salud Sector II La Victoria-2019	<p><b>V.I.:</b> Factores socioculturales</p> <p><b>V.D.:</b> Renuencia al examen de Papanicolau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factores Sociodemográficos</li> <li>• Factores culturales</li> <li>• Nivel de conocimientos</li> </ul>	Encuesta Cuestionario

*Fuente.* Elaboración propia

## ANEXO 2

### INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

## ENCUESTA

**I. OBJETIVO:** Describir los factores socioculturales influyentes en la renuencia al examen de Papanicolaou en usuarias del centro de salud sector II la Victoria-2019

El siguiente cuestionario es anónimo, por favor marcar con una “X” la respuesta que usted crea conveniente.

### II. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS:

1.- ¿Qué edad tiene usted? \_\_\_\_\_ años

2.- ¿Cuál es su estado civil?

- a) Soltera. ( )
- b) Casada ( )
- c) Conviviente ( )
- d) Viuda ( )
- e) Divorciada ( )

3.- ¿Qué nivel de instrucción tiene usted?

- a) Sin instrucción ( )
- b) Primaria ( )
- c) Secundaria ( )
- d) Técnico ( )
- e) Universitario ( )

4.- ¿Cuál es su ocupación?

- a) Ama de casa ( )
- b) Independiente ( )
- c) Dependiente ( )

5.- ¿A qué Religión pertenece?

- a) Católica ( )
- b) Evangélica ( )
- c) Otros ( )

### III. FACTORES CULTURALES:

6.- ¿Tiene usted alguna creencia sobre la toma de Papanicolaou?

- a) Si ( )
- b) No ( )

**Preguntas sobre creencias del Papanicolaou:**

- a) ¿El Papanicolaou solo se toma si hay alguna molestia, porque puede provocar flujo? ( SI ) ( NO)
- b) ¿Si se toma el Papanicolaou va sentir dolor y provocar sangrado? ( SI ) ( NO)
- c) ¿Tomarse el Papanicolaou y mostrar sus partes íntimas, es una ofensa para la mujer (vergüenza)? ( SI ) ( NO)
- d) ¿Si se toma el Papanicolaou, le puede ocasionar una infección? ( SI ) ( NO)
- e) ¿Durante la toma de Papanicolaou, sacan un pedazo de cuello uterino? ( SI ) ( NO)
- f) ¿Solo las mujeres que tienen parejas sexuales deben hacerse el Papanicolaou? ( SI ) ( NO)
- g) ¿Solo las mujeres que tienen hijos deben hacerse el Papanicolaou? ( SI ) ( NO)
- h) ¿Es necesario que la pareja esté de acuerdo con que se realice el Papanicolaou? ( SI ) ( NO)
- i) ¿Realizar la toma de Papanicolaou es costoso? ( SI ) ( NO)
- j) ¿Si tienes una sola pareja sexual (esposo o conviviente) no debes realizarte la toma de Papanicolaou? ( SI ) ( NO)

**7.- ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido usted? \_\_\_\_\_**

**8.- ¿Cuántos hijos tiene usted? \_\_\_\_\_**

**9.- ¿A qué edad inicio sus relaciones sexuales?**

- a) 15 - 22 años ( )
- b) 23 - 30 años ( )
- c) 31 - 38 años ( )
- d) 39 - 46 años ( )
- e) 47 - 54 años ( )
- f) 55 años a más ( )

**10.- ¿Hace cuánto no se hace su Papanicolaou?**

- a) Menos de 3 años ( )
- b) Mayor a 3 años ( )

#### **IV. FACTORES RENUENTES AL CONTROL DEL PAPANICOLAOU**

##### **11. ¿Qué es el examen de Papanicolaou?**

- a) Es un método para detectar células cancerígenas en los ovarios. ( )
- b) Es un examen para detectar cáncer del cuello uterino. ( )
- c) Es un examen para detectar si la mujer es fértil. ( )
- d) Es un examen de laboratorio para saber si hay infección del útero. ( )

##### **12. ¿Dónde se debe realizar el examen de Papanicolaou?**

- a) Puesto de Salud ( )
- b) Clínica Privada ( )
- c) Centro de Salud ( )
- d) Hospital ( )

##### **13. ¿Con qué frecuencia se practica el examen de Papanicolaou?**

- a) Una vez al año ( )
- b) Dos veces al año ( )
- c) Tres veces al año ( )
- d) Nunca ( )

##### **14. ¿Qué beneficios aporta este examen de Papanicolaou en la salud?**

- a) Previene de las enfermedades de transmisión sexual. ( )
- b) Previene el contagio con algún virus. ( )
- c) Previene de padecer cáncer del cuello uterino. ( )
- d) No tiene ningún beneficio para la salud. ( )

Muchas gracias por su participación

**ANEXO 3**



**CONSENTIMIENTO INFORMADO**

Yo.....

Identificado con DNI..... Declaro haber sido informada de manera clara, precisa y oportuna por la estudiante: Obdulia Consuelo Torres Diaz de la Universidad “Señor de Sipán”, de los fines que busca la presente investigación titulada, FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA RENUENCIA AL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019

Los datos obtenidos de mi participación serán finalmente copiados por la investigadora además procesara en secreto y en estricta confidencia respetando mi intimidad.

Por lo expuesto otorgo mi consentimiento a que se me realice la encuesta o entrevista.

Chiclayo.....de..... 2019

\_\_\_\_\_  
INVESTIGADORA RESPONSABLE

\_\_\_\_\_  
PARTICIPANTE

## ANEXO 4

### VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

#### VALIDACIÓN DE EXPERTOS

Estimada Licenciada. Sírvase por medio de la presente validar el contenido y el constructo del presente instrumento, teniendo en cuenta la siguiente valoración categorial:

0	1	2	3	4
TD	D	I	A	TA
Total Desacuerdo	Desacuerdo	Indiferente	Acuerdo	Totalmente

Cuestionario de la investigación: FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA RENUENCIA AL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019

Nº	ÍTEM	VALIDACIÓN CONTENIDO					VALIDACIÓN CONSTRUCTO				
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
01	¿Qué edad tiene usted?				X					X	
02	¿Cuál es su estado civil?				X					X	
03	¿Qué nivel de instrucción tiene usted?				X					X	
04	¿Cuál es su ocupación?				X					X	

05	¿A qué Religión pertenece?				X					X	
06	¿Tiene usted alguna creencia sobre la toma de Papanicolaou?				X					X	
07	De las preguntas sobre creencias del papanicolaou, ¿cuáles son para usted creencias?				X					X	
08	¿Cuántas parejas sexuales ha tenido usted?				X					X	
09	¿Cuántos hijos tiene usted?				X					X	
10	¿Desde cuándo usted inició las relaciones sexuales?				X					X	
11	¿Hace cuánto no se hace su Papanicolaou?				X					X	



12	¿Qué es el examen de Papanicolaou?				X					X	
13	¿Dónde se debe realizar el examen de Papanicolaou?				X					X	
14	¿Con qué frecuencia se practica el examen de Papanicolaou?				X					X	
15	¿Qué beneficios aporta este examen de Papanicolaou en la salud?				X					X	

APELLIDOS Y NOMBRES: Villafraña Velazquez Rosa Luz

DNI: 16 768070

ESPECIALIDAD: Administración en los Servicios de Salud Especializada

GRADO: Magister en Gestión de Servicios de Salud



### VALIDACIÓN DE EXPERTOS

Estimada Licenciada. Sírvase por medio de la presente validar el contenido y el constructo del presente instrumento, teniendo en cuenta la siguiente valoración categorial:

0	1	2	3	4
TD	D	I	A	TA
Total Desacuerdo	Desacuerdo	Indiferente	Acuerdo	Totalmente

Cuestionario de la investigación: FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA RENUENCIA AL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019

Nº	ÍTEM	VALIDACIÓN CONTENIDO					VALIDACIÓN CONSTRUCTO					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
01	¿Qué edad tiene usted?					X						X
02	¿Cuál es su estado civil?					X						X
03	¿Qué nivel de instrucción tiene usted?					X						X
04	¿Cuál es su ocupación?					X						X

05	¿A qué Religión pertenece?					X					X
06	¿Tiene usted alguna creencia sobre la toma de Papanicolaou?					X				X	
07	De las preguntas sobre creencias del papanicolaou, ¿cuáles son para usted creencias?				X				X		
08	¿Cuántas parejas sexuales ha tenido usted?					X					X
09	¿Cuántos hijos tiene usted?					X					X
10	¿Desde cuándo usted inició las relaciones sexuales?					X	X				
11	¿Hace cuánto no se hace su Papanicolaou?					X					X
12	¿Qué es el examen de Papanicolaou?					X				X	
13	¿Donde se debe realizar el examen de Papanicolaou?					X					X
14	¿Con qué frecuencia se practica el examen de Papanicolaou?				X						X
15	¿Qué beneficios aporta este examen de Papanicolaou en la salud?					X					X

APELLIDOS Y NOMBRES: GAMONAL CRUZ, ROCIO DEL CARMEN

DNI: 16426271

ESPECIALIDAD: \_\_\_\_\_

GRADO: MAGISTER: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.



### VALIDACIÓN DE EXPERTOS

Estimada Licenciada. Sírvase por medio de la presente validar el contenido y el constructo del presente instrumento, teniendo en cuenta la siguiente valoración categorial:

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>TD</b>	<b>D</b>	<b>I</b>	<b>A</b>	<b>TA</b>
Total Desacuerdo	Desacuerdo	Indiferente	Acuerdo	Totalmente

Cuestionario de la investigación: FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA RENUENCIA AL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019

Nº	ÍTEM	VALIDACIÓN CONTENIDO					VALIDACIÓN CONSTRUCTO					
		0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
01	¿Qué edad tiene usted?				X						X	
02	¿Cuál es su estado civil?				X						X	
03	¿Qué nivel de instrucción tiene usted?				X						X	
04	¿Cuál es su ocupación?				X						X	

05	¿A qué Religión pertenece?				X						X	
06	¿Tiene usted alguna creencia sobre la toma de Papanicolaou?				X						X	
07	De las preguntas sobre creencias del papanicolaou, ¿cuáles son para usted creencias?				X						X	
08	¿Cuántas parejas sexuales ha tenido usted?				X						X	
09	¿Cuántos hijos tiene usted?				X						X	
10	¿Desde cuándo usted inició las relaciones sexuales?				X						X	
11	¿Hace cuánto no se hace su Papanicolaou?				X						X	

12	¿Qué es el examen de Papanicolaou?				X					X	
13	¿Donde se debe realizar el examen de Papanicolaou?				X					X	
14	¿Con qué frecuencia se practica el examen de Papanicolaou?				X					X	
15	¿Qué beneficios aporta este examen de Papanicolaou en la salud?				X					X	

APELLIDOS Y NOMBRES: DIÁZ CORONEL HANÁ ANTONIA

DNI: 16461958

ESPECIALIDAD: ENFERMERIA EN CUIDADOS INTENSIVOS

GRADO: MAESTRO

  
HANÁ A. DIÁZ CORONEL  
CEP: 13147.

## ANEXO 5

### AUTORIZACION Y/O CONSTANCIA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

Aplicación de encuesta a usuarias que acuden al Centro de Salud la Victoria Sector II



**Figura 13.** Imagen de una usuaria del Centro de Salud la Victoria II siendo encuestada  
**Fuente.** Elaboración propia

Aplicación de encuesta a usuarias que acuden al Centro de Salud la Victoria Sector II



**Figura 14.** Imagen de una usuaria del Centro de Salud la Victoria II siendo encuestada  
**Fuente.** Elaboración propia

## ANEXO 6



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
RED DE SALUD CHICLAYO  
CENTRO DE SALUD LA VICTORIA SECTOR II



**“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”**

### **AUTORIZACIÓN**

El Médico Jefe del Centro de Salud La Victoria Sector II que suscribe, expide la presente autorización: a **Obdulia Consuelo Torres Diaz**, estudiante de la Escuela de Enfermería de la Universidad “Señor de Sipan”-Chiclayo, con la finalidad que pueda realizar la recolección de datos para la ejecución de su proyecto de investigación denominado: “FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA RENUENCIA AL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019”.

Se expide la presente a solicitud de la parte interesada para los fines que estime conveniente.

La Victoria, 04 de Setiembre del 2019



C.c  
-Archivo CSLVSII

---

“Personas que Atendemos Personas”  
DIRECCION: Calle Paul Harris N° 1198 LA VICTORIA-CHICLAYO, TELEFONO: 074493219  
cslavictoria2@geresalambayeque.gob.pe

## ANEXO 7

### FORMATO N° T1 AUTORIZACION DE PUBLICACION DEL AUTOR

FORMATO N° T1-VRI-USS AUTORIZACIÓN DEL AUTOR  
(LICENCIA DE USO)


Pimentel, 29 de noviembre del 2019

Señores  
Vicerrectorado de investigación  
Universidad Señor de Sipán  
Presente.-  
EL suscrito:  
OBDULIA CONSUELO TORRES DIAZ, con DNI 16513740

En mí (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) del trabajo de grado titulado: FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA RENUENCIA AL EXAMEN DEL PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019, presentado y aprobado en el año 2019 como requisito para optar el título de LICENCIADA EN ENFERMERIA, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa Académico de Enfermería, por medio del presente escrito autorizo (autorizamos) al Vicerrectorado de investigación de la Universidad Señor de Sipán para que, en desarrollo de la presente licencia de uso total, pueda ejercer sobre mi (nuestro) trabajo y muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad representado en este trabajo de grado, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado a través del Repositorio Institucional en el portal web del Repositorio Institucional – <http://repositorio.uss.edu.pe>, así como de las redes de información del país y del exterior.
- Se permite la consulta, reproducción parcial, total o cambio de formato con fines de conservación, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de investigación y a su autor.

De conformidad con la ley sobre el derecho de autor decreto legislativo N° 822. En efecto, la Universidad Señor de Sipán está en la obligación de respetar los derechos de autor, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

APELLIDOS Y NOMBRES	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
TORRES DIAZ OBDULIA CONSUELO	16513740	

## ANEXO 8

### ACTA DE ORIGINALIDAD DE

#### Acta de originalidad de informe de investigación

Yo, Heredia Llatas Flor Delicia, docente de la asignatura de Investigación II, de la Escuela Profesional de Enfermería y revisora de la investigación aprobada mediante Resolución N° 0274 – 2019/FCS-USS del estudiante TORRES DIAZ OBDULIA CONSUELO

Titulada: FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA RENUENCIA AL EXAMEN DEL PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019

Puedo constar que la misma tiene un índice de similitud del 02 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el software de similitud.

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con lo establecido en la Directiva de Similitud aprobada mediante Resolución de Directorio N° 016-2019/PD-USS de la Universidad Señor de Sipán.

Pimentel, 29 noviembre del 2019



---

Mg. Heredia Llatas Flor Delicia

DNI N°41365424



INFORME DE INVESTIGACION

ANEXO 9

REPORTE TURNITIN

# FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA RENUENCIA AL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN USUARIAS DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019

por *Obdulia Consuelo* Fecha de entrega: 21-jul-2020 04:04p.m. (UTC-0500) Torres Díaz

Identificador de la entrega: 1360527425

Nombre del archivo: Torres\_Diaz\_Obdulia\_Consuelo.docx (1.01M)

Total de palabras: 7908

Total de caracteres: 42083

FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LA  
RENUENCIA AL EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN USUARIAS  
DEL CENTRO DE SALUD SECTOR II LA VICTORIA-2019

INFORME DE ORIGINALIDAD

**23%**

INDICE DE SIMILITUD

**17%**

FUENTES DE  
INTERNET

**1%**

PUBLICACIONES

**19%**

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE