



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA

TESIS

DIAGNÓSTICO ENFERMERO EN LOS ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN
EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE SALUD TÚPAC AMARU,
CHICLAYO 2014

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORAS:

Carrillo Millones Suzety Guisella

Toro Ukugchan Susana del Carmen

PIMENTEL, MAYO 2014

Resumen

Los diagnósticos enfermeros, son esenciales para brindar un cuidado holístico y humanizado, por ello, esta investigación cuantitativa descriptiva tuvo como objetivo identificar los diagnósticos de enfermería en las personas atendidas en el Programa Adulto Mayor del Centro de Salud Túpac Amaru, en los meses de enero a marzo. La población muestral fueron 61 adultos mayores, aplicándoseles tres técnicas: entrevista, observación y examen físico, datos que se registraron en la guía de valoración por dominios en base a lo establecido por la NANDA 2012-2014. Se aplicaron estrategias para asegurar el rigor científico y los principios éticos en el estudio. Se usó el programa estadístico, Microsoft Excel 2013, en el que se obtuvo que el diagnóstico real más frecuente fue: ansiedad (00146) relacionado con cambios en el estado de salud, el diagnóstico de riesgo, riesgo a caídas (00155) relacionado con disminución de la fuerza muscular, se identificó en un 84% y el diagnóstico de promoción de la salud: disposición para mejorar la gestión de la propia salud (00162) se identificó en el 21% de los adultos mayores. No se identificaron diagnósticos de síndrome. Estos resultados permiten orientar las intervenciones que realiza la enfermera en este programa.

Palabras claves: Diagnóstico Enfermero, respuestas humanas, Adultos Mayores.

Abstract

The nursing diagnoses are essential to provide a holistic and humane care, therefore, this descriptive quantitative research aimed to identify the nursing diagnoses in the patients treated in the Elderly Program Health Center Tupac Amaru, in the months of January to March. The sample populations were 61 seniors, you generally apply three techniques: interview, observation and physical examination, data were recorded in the assessment guide for domains based on the provisions of the NANDA 2012-2014. Strategies were applied to ensure scientific rigor and ethical principles in the study. Anxiety (00146) related to changes in health status, diagnosis risk falls (00155) associated with decreased: the, Microsoft Excel 2013 statistical program in which it was found that the most frequent actual diagnosis was used muscle strength, was identified by 84% and the willingness to improve the management of their own health (00162) was identified in 21% of older adults. No syndrome diagnoses were identified. These results guide interventions carried out by the nurse in this program.

Keywords: Nurse Diagnosis, human responses, Older Adults