



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA**

**TESIS**

**“Prevalencia de recesiones gingivales en pacientes atendidos  
en el servicio de odontología del Hospital Regional  
Lambayeque de Chiclayo, Perú, 2014”.**

**PARA OPTAR POR EL TITULO DE CIRUJANO DENTISTA**

**Autora**

Marcos Chacón, Lesly Katherine

**Asesor Metodòlogo**

Mg. Vásquez Plasencia, Cesar

**Asesor Especialista**

C.D. Esp Calderón Cortez Ivan

**Pimentel – Perú**

**2015**

## RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de recesiones gingivales en los pacientes que fueron atendidos en el servicio de odontología del Hospital Regional Lambayeque.

Diseño Descriptivo Simple- transversal. La población corresponde a 103 pacientes atendidos en la consulta odontológica del Hospital Regional Lambayeque.

Para este propósito se evaluó a 103 pacientes, se midieron en todas las piezas dentales presentes la distancia margen gingival – unión cemento esmalte de las caras vestibulares, y se consideró como recesión gingival en aquellos dientes en que esta fuera igual o mayor a 1mm.

Los resultados indican una prevalencia de 76.7% de pacientes afectados por algún grado de recesión gingival, se encontró una mayor prevalencia de recesión gingival en los pacientes del sexo masculino con un 84.7% y 58.6% de pacientes de sexo femenino, con una diferencia estadísticamente significativa ( $p < 0.05$ ).

Las conclusiones fueron que la prevalencia de la recesión gingival aumentó conforme aumentaba la edad de las personas y es frecuente en individuos de sexo masculino.