



UNIVERSIDAD
SEÑOR DE SIPÁN

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD**

ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

TESIS

PLANOS POST-LÁCTEOS Y SU RELACIÓN CON
EL TIPO DE LACTANCIA EN NIÑOS DE 3 AÑOS
DEL CENTRO DE SALUD JOSÉ OLAYA.

CHICLAYO, 2014

Para optar el título profesional de
CIRUJANO DENTISTA

AUTORA

CASTILLO BACALLA, MELANY YSABEL

ASESOR METODOLÓGICO

Mg. C.D. VASQUEZ PLASENCIA, CÉSAR

ASESOR ESPECIALISTA

C.D. ESP. HUAYLLASCO DE LA CRUZ, JULIO CÉSAR

Pimentel – Perú

2015

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue relacionar a los planos post-lácteos con el tipo de lactancia, ya sea materna, artificial o mixta, recibido durante los 6 primeros meses, para tal fin se realizó un estudio analítico-correlacional y transversal en una muestra de niños de 3 años de edad con dentición primaria completa, que acudieron durante el año 2014 al Centro de Salud José Olaya de la ciudad de Chiclayo.

El tamaño muestral fue de 65 niños de los cuales, se encontró que los niños que presentaron plano terminal recto, 39.1% han recibido lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, el 60.9% han recibido lactancia mixta y ninguno recibió lactancia artificial exclusiva. En los niños que presentaron escalón mesial ninguno recibió lactancia mixta, ni lactancia artificial exclusiva, sino que la totalidad recibió lactancia materna exclusiva y en los niños que presentaron escalón distal sólo recibieron lactancia artificial exclusiva.

Se concluyó que los tipos de planos post-lácteos se relacionan significativamente con los tipos de lactancia recibida durante los 6 primeros meses de desarrollo en los niños de 3 años de edad del Centro de Salud José Olaya. Chiclayo, 2014.