



FACULTAD DE PSICOLOGÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

TESIS

Factores de riesgo psicosocial y depresión en las estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa Lucie Rynning de Antúnez de Méjico, Rímac - 2013

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA

Autor

Bach. Chuchón Sulca, Kenneth Sheila

Pimentel, noviembre 2014

Resumen

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores de riesgo psicosocial y la depresión en las estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Lucie Rynning de Antúnez de Mýolo, Rímac - 2013. Diseño empleado no experimental, descriptivo correlacional; Muestra estuvo integrada por 90 estudiantes del 1º grado al 3º grado de secundaria. Instrumentos utilizados, Ficha Integral - B (FIFR) de Malpica, para determinar los factores de riesgo psicosocial, Escala de Depresión para Adolescentes (EDAR) de Reynolds, para conocer los niveles de depresión. Los resultados presentaron las siguientes distribuciones porcentuales: factores de riesgo psicosocial general - área familiar: sin riesgo 2%, bajo 37%, mediano 37% y alto 24%; área social: sin riesgo es: 28%, bajo 19%, mediano 21% y alto 32%; área académica: sin riesgo 11%, bajo 48%, mediano 24% y alto 17%; área salud: sin riesgo 34%, bajo 1%, mediano 28% y alto 37%; factores de riesgo psicosocial general: sin riesgo 3%, bajo 51%, mediano 27% y alto 19%; depresión en general: sin depresión 4%, leve 50%, moderado 34% y severo 12%. En conclusión existe una relación significativa entre los factores de riesgo psicosocial y la depresión en las estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Lucie Rynning de Antúnez de Mýolo, Rímac - 2013. Se encontró nivel estadístico significativo entre los factores de riesgo psicosocial del área familiar y académico con la depresión.

Palabras clave: Factores de riesgo psicosocial, depresión, estudiantes de secundaria.

Abstract

The research aimed to determine the relationship between psychosocial risk factors and depression in students of secondary level educational institution Lucie Rynning Antunez of MÁyolo, Rímac - 2013. Employee no experimental design, descriptive correlational; Sample consisted of 90 students from 1st grade to 3rd grade of high school. Instruments used, Integral Sheet - B (FIFR) Malpica, to identify psychosocial risk factors, Adolescent Depression Scale (EDAR) Reynolds, for levels of depression. The results showed the following percentage distribution: general psychosocial risk factors - family area: safe 2% under 37 %, middle 37 % and top 24%; social area : no risk is 28 %, low 19%, middle 21% and top 32 %; academics: no risk 11%, low 48 %, medium 24%, high 17%; health area: safe 34% low1 %, medium 28 %, high 37 %; general psychosocial risk factors : no risk 3% low 51 %, middle 27% and top 19%; depression in general: no depression 4%, mild 50 %, moderate 34 %, severe 12%. In conclusion there is a significant relationship between psychosocial risk factors and depression in students of secondary level educational institution Lucie Rynning Antunez of MÁyolo, Rímac - 2013. Statistically significant between psychosocial risk factors of family and academic area with depression was found.

Key Words: *Psychosocial risk factors, depression, students of secondary.*