



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA
TESIS

**PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES EN
ALUMNOS DE 12 A 16 AÑOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE
DEL DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ-
CHICLAYO- LAMBAYEQUE -PERÚ, 2015.**

Para optar el título profesional de
CIRUJANO DENTISTA

AUTORA:
MORANTE ROJAS FLOR DE BELÉN

ASESOR METODOLÓGICO:
MS. CD. ESP. CÓRDOVA SALINAS IMER DUVERLÍ.

ASESOR ESPECIALISTA:
MS. CD. ESP. GAMARRA DÍAZ LUIS GUSTAVO

Pimentel – Perú, 2015.

RESUMEN

Conocer la prevalencia de las maloclusiones es esencial para el desarrollo de estrategias preventivas basándose en las necesidades de la población. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de maloclusiones en alumnos de 12 a 16 años en la Institución Educativa Nicolás La Torre del distrito José Leonardo Ortiz. El tipo y diseño de estudio que se realizó fue cuantitativo, descriptivo, transversal, observacional. Se realizó un muestreo probabilístico de población conocida. La muestra estuvo constituida por 230 estudiantes de 1^{ro} a 5^{to} grado de secundaria quienes cumplieron los criterios de selección. Se empleó un nivel de significancia de 0.05 con un nivel de confianza del 95%. El programa estadístico utilizado fue SPSS versión 22.

Se utilizó la estadística descriptiva para ordenar y tabular los datos obtenidos, determinándose los resultados porcentuales usando tablas de distribución de frecuencias y gráficos. Se encontró como resultados que del 100% de alumnos evaluados el 2,6% presentaron normoclusión y el 97,4% presentaron alguna clase de maloclusión. Del 100% de maloclusiones, según clase el 58,9% presentaron una maloclusión clase I; 30,4% clase III; 9,4% clase II-1 y el 1,3% clase II-2. En la prevalencia de maloclusiones clase I fue más prevalente en sexo femenino 52,3% que el masculino 47,7%; para la clase II-1 en sexo femenino 66,7% que el masculino 33,3%; en la clase II-2 en sexo masculino 100% y en clase III hubo más prevalencia en sexo femenino 54,4% que en masculino 45,6%. al grupo etario la clase I fue más prevalente a los 13 años 28,8%; la clase II-1 a los 14 años 42,9%; la clase II-2 a los 12,15 y 16 años 33,3%; la clase III a los 13 años 27,9%. Se concluye que la prevalencia de maloclusiones en alumnos de 12 a 16 años de la Institución Educativa Nicolás La Torre es del 97,4% siendo la más frecuente la maloclusión clase I.