



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional De Enfermería

TESIS

**FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DE
TRATAMIENTO EN PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LA MICRO RED, CHICLAYO
2015**

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería

AUTORAS:

BACH. LLANOS TOCAS JANETTE MIRELY

**BACH. TRUJILLO DE LOS SANTOS ROSARIO DEL
MILAGRO**

Pimentel, Julio del 2015

RESUMEN

El control de la tuberculosis es un reto para la salud pública, el no cumplimiento del tratamiento puede llevar a complicaciones fatales y a la emergencia de cepas resistentes. Esta investigación cuantitativa descriptiva tiene por objetivo determinar los factores asociados al abandono de tratamiento en personas afectadas por tuberculosis atendidos en la Micro Red Chiclayo. Con una población muestral de 26 pacientes que abandonaron el tratamiento de TBC, aplicándoseles un cuestionario previamente validado, obteniendo una confiabilidad de 0.663. El paquete estadístico usado fue Excel. Se respetaron los principios éticos y de rigor científico. Los resultados revelan que el 69% de los encuestados son hombres, con edades entre 21 a 30 años con un 38%; entre los factores relacionados con el paciente se obtuvo que el 58% considera regular el apoyo de su familia, en los factores relacionados con el tratamiento el 77% señala, muchas pastillas se le administran y en el factor relacionado con la institución el 85% sólo recibió información al iniciar su tratamiento, la prueba estadística de Pearson (>0.05), concluye que el factor relacionado con la institución es el que está más asociado al abandono de tratamiento dejando una reflexión para el profesional de enfermería en el cumplimiento de la normatividad de la estrategia sanitaria, ameritando una sostenibilidad permanente de los cuidados brindados, teniendo énfasis en educación continua y en el fortalecimiento de la familia del paciente para que cuente con el apoyo esperado y evitar así el abandono del tratamiento.

ABSTRAC

Control of tuberculosis is a challenge for public health, not treatment Compliance Wear Flowers fatal complications and the emergence of resistant strains. This descriptive quantitative research aims to determine the factors associated with the abandonment of treatment in people affected by TB treated at the Red Micro Chiclayo. With a population sample of 26 patients who discontinued treatment of TB and generally apply UN previously validated questionnaire, obtaining a reliability of 0.663. The statistical package used was Excel. The ethical and scientific rigor principles were respected. The results reveal that 69% of male respondents son, aged 21-30 years with a 38%; Among the patient-related factors was obtained that 58% consider regular support from his family, in the factors related to the treatment 77% points out, many pills are administered and the factor related to the Institution Only 85% received treatment Information Start Do, the statistical test of Pearson (> 0.05), concluded that the factor related to the institution is the one most associated to the abandonment of treatment leaving a reflection for the nurse in Compliance with the regulations of the Health Strategy, meriting A permanent sustainability of care provided, with emphasis on continuing education and on the Strengthening of Family Patient to count with the expected support to avoid the abandonment of treatment