



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela Académico Profesional De Enfermería

TESIS

**BARRERAS QUE INTERFIEREN EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS DIEZ PASOS DE LA
LACTANCIA MATERNA POR LOS
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN EL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS
MERCEDES - 2015.**

**Para Optar El Título Profesional De Licenciado En
Enfermería**

Autoras:

**Bach. KATHERINE STEPHANY FUENTES
TARRILLO**

Bach. JANET STEFANY MUÑOZ MACO

Pimentel, 14 Diciembre del 2015

RESUMEN

La investigación se realizó durante la práctica en los servicios de neonatología y alojamiento conjunto donde se brinda la atención del recién nacido, del (H.R.D.L.M), donde observándose que la mayoría de neonatos, reciben sucedáneos de la leche materna; y no se da una lactancia materna exclusiva, siendo esta importante, porque ayuda a mejorar la salud integral del R.N; La investigación tuvo como objetivo conocer el nivel de conocimiento del profesional de enfermería sobre la aplicación de los diez pasos de la lactancia materna; identificar los pasos que incumple y identificar las barreras existentes. La metodología empleada fue de tipo cuantitativa con diseño descriptivo, utilizando como herramienta de recolección de datos 50 cuestionarios para el procesamiento de la información acerca del nivel de conocimiento del profesional de Enfermería sobre la aplicación de los 10 pasos de la lactancia materna donde el 36% posee un nivel regular de conocimiento sobre la aplicación de los diez pasos de la lactancia materna, el 40% tiene un nivel bueno y solo el 24% un nivel malo. Los pasos que incumplieron fueron el paso 1 Dispone el Hospital Regional Docente Las Mercedes de protocolos escritos para la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna, disponible de modo que todo el personal que atiende a las madres y a los bebés pueda consultarla, paso 2 Ha recibido capacitación y formación sobre la aplicación de las normas de lactancia durante los últimos 6 meses, paso 7 Permanece junto al binomio madre/hijo las 24 horas del día (en la misma habitación o la misma cama), el paso 10 dispone el hospital de un sistema de seguimiento y apoyo a las madres tras el alta.

Las barreras que interfirieron en el cumplimiento de los diez pasos fueron los factores relacionados al personal de salud FPS 1, lo cual se obtuvo un porcentaje de (46%), FPS2 (40%), FPS3 (38%), FPS8 (38%) y FPS 9 (59%). Las barreras relacionadas al contexto social que interfirieron fueron el FCS3 lo cual obtuvo un porcentaje de (40%), factores relacionados al contexto organizativo FCO3 (50%) y el FCO6 (14%); en menor proporción.

Se tuvo como criterios de rigor científico la credibilidad y transferencia, Se recomienda involucrar en próximos estudios a mujeres gestantes y a puerperas respecto al método para obtener la información debe incluirse la observación directa y el diario de campo

Abstract

The research was conducted during practice in neonatology services and rooming where newborn care, the (HRDLM), which observed that the majority of infants receiving breast milk substitutes is provided; and exclusive breastfeeding is not given, this being important, because it helps improve the overall health of the newborn; The research aimed to know the level of knowledge of nursing professionals on the implementation of the ten steps of breastfeeding; identify and describe steps that violates existing constraints. The methodology used was quantitative descriptive type with design, using data collection tool 50 questionnaires for the processing of information about the level of knowledge of nursing professionals on the implementation of the 10 steps of breastfeeding where 36% has a regular level of knowledge on the implementation of the ten steps of breastfeeding, 40% have a good level and only 24% had a bad level. The steps were breached step 1 has the Las Mercedes Regional Hospital of written protocols for the protection, promotion and support of breastfeeding, available so that all staff caring for mothers and babies can refer, step 2 has received training and training on the application of the rules of breastfeeding during the last six months, Step 7 Stay with the mother / child pairs 24 hours a day (in the same room or the same bed), step 10 provides the

The barriers that interfered with the performance of the ten steps were the factors related to health personnel FPS 1 which a percentage of (46 %) , FPS2 (40 %) , FPS3 (38%), FPS8 (obtained 38 %) and FPS 9 (59%) . Barriers related to social context were interfered FCS3 which obtained a percentage of (40 %) , factors related to organizational context FCO3 (50 %) and FCO6 (14 %) ; proporción. Se at least had the criteria of scientific rigor and credibility transfer is recommended engage in further studies to pregnant women and puerperal women regarding the method to obtain information direct observation and field diary should include