

USS



**UNIVERSIDAD
SEÑOR DE SIPÁN**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Enfermería

TESIS

**FACTORES ASOCIADOS A LA ANSIEDAD DEL
PACIENTE EN EL PRE OPERATORIO INMEDIATO
EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL
PROVINCIAL DOCENTE BELÉN, LAMBAYEQUE.**

ENERO, 2015

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería

AUTORAS:

BACH: MAYO ALVARADO LORENA GRACIELA

BACH: RODRÍGUEZ MELÉNDEZ JANETH ROCIO

Pimentel, julio del 2015.

RESUMEN

Toda cirugía genera ansiedad en la persona, si esta excede los límites trae como consecuencia complicaciones en el intra y post-operatorio por ello, determinar los factores asociados a la ansiedad del paciente en el pre-operatorio inmediato atendido en el servicio de cirugía del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque en enero de 2015 fue el objetivo de ésta investigación cuantitativa correlacional. La población muestral fue de 80 personas que cumplieron con los criterios de elegibilidad, a las que se les aplicó previo consentimiento informado, el cuestionario “Factores asociados a la ansiedad” (confiabilidad de 0.966 Alfa de Cronbach) elaborado por las investigadoras en base al cuestionario para determinar la ansiedad y el cuestionario de los factores asociados a la ansiedad. Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 15. Se resguardó los principios éticos y el rigor científico. Los resultados muestran que un porcentaje considerable (17.5%) alcanza un nivel alto en los factores predisposicionales en donde predomina la dimensión biológica, seguida de los de mantenimiento donde recalca la dimensión situaciones y acontecimientos. Se destaca que el 60% de los pacientes tienen ansiedad, en el que solo el 5% alcanzaron un nivel alto, el 25% nivel medio y 30% nivel bajo. La prueba estadística del Chi Cuadrado permite afirmar que existe asociación entre los factores predisposicionales y mantenimiento con los niveles de ansiedad, rechazándose la hipótesis planteada en el que se afirmaba que los factores activadores están asociadas con el nivel de ansiedad.

ABSTRACT

Every surgery creates anxiety in the person, if it exceeds the limits results in complications in the intra- and post-operative therefore determine the factors associated with patient anxiety in the immediate pre-operative treated in the surgery department of the Hospital Provincial Teaching Bethlehem Lambayeque in January 2015 was the target of this correlational quantitative research. The sample population was 80 people who met the eligibility criteria, which were applied prior informed consent, the survey "Factors associated with anxiety" (reliability of 0.966 Alpha Cronbach) developed by the researchers based on the questionnaire to determine anxiety and questionnaire factors associated with anxiety. Data were processed in SPSS 15. The ethical principles will be guarded and scientific rigor. The results show that a significant percentage (17.5%) reached a high level in the dispositional factors where the biological dimension, followed by maintenance where situations and events emphasizes dimension predominates. It highlights that 60% of patients have anxiety, in which only 5% reached a high level, 25% intermediate and 30% low. The statistical test Chi Square to suggest that there is an association between dispositional factors and maintenance anxiety levels, rejecting the hypothesis in which it was stated that the activating factors are associated with the level of anxiety.